

## PLAKOUT\*collutorio 150 ml 0,12%

**Marchio:** POLIFARMA  
BENESSERE SRL

**Codice Min.:** 032142022

**Link:** [clicca qui per acquistare](#)

**DENOMINAZIONE** PLAK OUT 0,12% **SOLUZIONE** **CATEGORIA** FARMACOTERAPEUTICA Stomatologici. **PRINCIPI ATTIVI** Plak Out 0,12% soluzione: 100 ml di soluzione contengono: principio attivo: clorexidina digluconato 0,12 g. Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1 **ECCIPIENTI** Plak Out 0,12% soluzione: lycasina, alcool etilico 96., polidocanolo, olio essenziale di menta, colorante E124, acqua depurata. **INDICAZIONI** Per la disinfezione del cavo orale. Sciacqui con Plak Out sono indicati nei casi di igiene orale difficoltosa. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. **POSODOLOGIA** Plak Out 0,12% soluzione, se non prescritto diversamente dal medico, procedere nel modo seguente: risciacquare la bocca con Plak Out 0,12% soluzione, da non diluire, 2-3 volte al giorno. Il misurino contiene 10ml. Cominciare con sciacqui di breve durata (10-15 secondi). L'azione disinfettante verra' aumentata con il prolungamento della durata dello sciacquo fino a 3-4 minuti. Dose massima: 3 sciacqui al giorno, corrispondenti a 36 mg di principio attivo. E' consigliabile effettuare gli sciacqui dopo i pasti, solo per il periodo necessario. Non superare le dosi consigliate. Eta' pediatrica: il prodotto va usato in caso di effettiva necessita' e sotto controllo del medico. **CONSERVAZIONE** Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare per la conservazione. **AVVERTENZE** Da usare solo per periodi limitati e comunque solo quando necessario. In assenza di risultati apprezzabili consultare il medico. L'ingestione o l'inalazione accidentale di taluni disinfettanti puo' avere conseguenze gravi, talvolta fatali. Evitare il contatto con gli occhi. Il prodotto e' solo per uso topico. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico puo' dare origine a fenomeni di sensibilizzazione, in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire una idonea terapia. Il medicinale non e' controindicato per i soggetti affetti da malattia celiaca. Per chi svolge attivita' sportiva: l'uso di medicinali contenenti alcool etilico puo' determinare positivita' ai test antidoping in rapporto ai limiti di concentrazione alcolemica indicata da alcune federazioni sportive. **INTERAZIONI** Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti. **EFFETTI INDESIDERATI** Patologie gastrointestinali: alterazione del gusto successivamente all'utilizzo. Decolorazione della lingua e dei denti tendenti al colore giallo dopo parecchie settimane di utilizzo continuativo a dosi elevate. La colorazione della lingua scompare diminuendo la frequenza e la durata degli sciacqui, mentre e' sufficiente una buona pasta dentifricia per eliminare la pigmentazione dello smalto dentale. Segnalazione delle reazioni avverse sospette. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale e' importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili). **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Durante gravidanza e allattamento, Plak Out va usato in caso di effettiva necessita' e sotto il controllo del medico.