

PREPARAZIONE H*ung derm 25 g 1,08%

Marchio: PREPARAZIONE H
Codice Min.: 017389091
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE PREPARAZIONE H 10,8 MG/G UNGUENTO
23 MG SUPPOSTE CATEGORIA
FARMACOTERAPEUTICA Altre sostanze per il trattamento di emorroidi e ragadi anali per uso topico. **PRINCIPI ATTIVI** 10,8 mg/g unguento: 100 g di unguento contengono: principio attivo: estratto di Cellule di Saccharomyces Cerevisiae 1,08 g. **Eccipienti con effetti noti:** lanolina, idrossitoluene butilato (BHT), metil-paraidrossibenzoato, propil-paraidrossibenzoato. Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 23 mg supposte Ogni supposta contiene: principio attivo: estratto di Cellule di Saccharomyces Cerevisiae 23 mg. Per l'elenco

completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. **ECCIPIENTI UNGUENTO:** olio di fegato di pesce; vaselina bianca; olio minerale leggero; argobase L2 (paraffina liquida, cera di lana, vaselina, lanolina anidra, ozokerite, idrossitoluene butilato (BHT)); lanolina; glicerolo; metil-p-idrossibenzoato; propil-p-idrossibenzoato; olio di timorosso. **SUPPOSTE:** olio di fegato di pesce; Witepsol W35, burro di cacao, paracera, dilaurato del glicol polietilenico 600, glicerolo. **INDICAZIONI** Emorroidi esterne ed interne non complicate e ragadi anali. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilità al principio attivo o a sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico, o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. **POSOLOGIA UNGUENTO (tubo):** applicare l'unguento fino a 2-3 volte al giorno, quando possibile, dopo ogni evacuazione. Per l'uso rettale, togliere il cappuccio, lubrificare l'applicatore ed avvitare al tubo. Spremere sino a riempire l'applicatore. Inserire nel retto, spremere nuovamente il tubo sino ad introdurre una sufficiente quantità di prodotto. Applicare la pomata anche sulla zona esterna. Dopo l'uso pulire l'applicatore e ricoprirlo con il cappuccio. **UNGUENTO (monodose):** applicare l'intero contenuto fino a 2-3 volte al giorno, quando possibile, dopo ogni evacuazione. Togliere il cappuccio, inserire l'applicatore nel retto, spremere l'intero contenuto del tubetto monodose. **SUPPOSTE:** rimuovere l'involucro di protezione ed introdurre nel retto fino a 2-3 supposte al giorno, quando possibile, dopo ogni evacuazione. **NON SUPERARE LE DOSI CONSIGLIATE.** **CONSERVAZIONE** Unguento: conservare a temperatura non superiore ai 25 gradi C. Supposte: conservare a temperatura non superiore ai 30 gradi C. **AVVERTENZE** Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il medico. L'uso, specie se prolungato dei prodotti per uso topico può dare luogo a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso è necessario interrompere il trattamento ed istituire una terapia idonea, dopo aver consultato il medico. In caso di sanguinamento o della persistenza del disturbo, consultare il medico. **NON USARE PER TRATTAMENTI PROTRATTI.** Preparazione H unguento contiene lanolina, che può causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatiti

da contatto). Preparazione H unguento contiene idrossitoluene butilato, che puo' causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatiti da contatto) o irritazione degli occhi e delle mucose. Preparazione H unguento contiene metil-paraidrossibenzoato e propil-paraidrossibenzoato che possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).

INTERAZIONI Non sono mai stati evidenziati problemi connessi all'interazione con altri farmaci.

EFFETTI INDESIDERATI Non sono stati riportati effetti indesiderati dovuti all'impiego di Preparazione H. Segnalazione delle reazioni avverse sospette. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale e' importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione riportato all'indirizzo www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Non esistono controindicazioni se il prodotto e' impiegato seguendo le modalita' e le precauzioni suggerite.