

PROCTOLYN*10 supp 0,1 mg + 10 mg

Marchio: PROCTOLYN
Codice Min.: 021925045
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE PROCTOLYN **CATEGORIA**
FARMACOTERAPEUTICA Antemorroidali per uso topico a base
di corticosteroidi. **PRINCIPI ATTIVI** Fluocinolone acetone e
chetocaina cloridrato. **ECCIPIENTI** Crema rettale: acido citrico,
mentolo metile para-idrossibenzoato, propile para-
idrossibenzoato, glicole propilenico, alcool stearilico, alcool
cetilico, olio di vaselina, sorbitan monostearato, polisorbato
60, acqua depurata. **Supposte:** acido citrico, mentolo, glicole
propilenico, polisorbato 60, sorbitan monostearato, silice
colloidale, gliceridisesintetici. **INDICAZIONI** Emorroidi interne
ed esterne; eczemi ed eritemi anali e perianali; ragadi anali;

prurito e bruciore anale e perianale; trattamento pre- e post-operatorio in chirurgia ano-
rettale. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli
eccipienti. Tbc, micosi, Herpes Symplex, malattie virali con localizzazione cutanea. **POSODOLOGIA** Crema
rettale: quanto basta a ricoprire la parte affetta massaggiandola lievemente e ripetendo l'applicazione 2-3
volte al giorno. Per l'applicazione interna servirsi dell'apposita cannula inserita sul tubetto. **Supposte:** 1
supposta al mattino ed 1 alla sera. Crema rettale e supposte possono essere usate per trattamenti
combinati. L'uso del farmaco non e' raccomandato nei bambini di eta' inferiore a 12 anni, a causa della
mancanza di dati sulla sicurezza ed efficacia. **CONSERVAZIONE** Questo medicinale non richiede alcuna
condizione particolare di conservazione. **AVVERTENZE** L'applicazione topica dei cortisonici in dosi
eccessive e per periodi prolungati puo' determinare un assorbimento sistemico. L'uso, specie se
prolungato, dei prodotti per uso topico puo' dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In presenza di
una infezione cutanea va istituita opportuna terapia di copertura. Con l'uso di corticosteroidi sistemici e
topici possono essere riferiti disturbi visivi. Se un paziente si presenta con sintomi come visione
offuscata o altri disturbi visivi, e' necessario considerare il rinvio a un oculista per la valutazione delle
possibili cause che possono includere cataratta, glaucoma o malattie rare come la corioretinopatia
sierosa centrale (CSCR), che sono state segnalate dopo l'uso di corticosteroidi sistemici e topici. La
crema rettale contiene metile para-idrossibenzoato e propile para-idrossibenzoato che possono
provocare reazioni allergiche; alcool stearilico ed alcool cetilico che possono causare reazioni sulla pelle
localizzate. **INTERAZIONI** Si ritiene che il trattamento concomitante con inibitori di CYP3A, compresi i
medicinali contenenti cobicistat, possa aumentare il rischio di effetti indesiderati sistemici.
L'associazione deve essere evitata ameno che il beneficio non superi il maggior rischio di effetti
indesiderati sistemici dovuti ai corticosteroidi; in questo caso e' necessario monitorare i pazienti per
verificare l'assenza di effetti indesiderati sistemici dovuti ai corticosteroidi. **EFFETTI INDESIDERATI** In

corso di terapia cortisonica topica, specie per trattamenti intensi e prolungati, possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: sensazione di bruciore, prurito, irritazione. Si può manifestare visione offuscata, con frequenza non nota. GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Il medicinale, deve essere usato in gravidanza solo in caso di necessità, dopo aver valutato il beneficio atteso per la madre in rapporto al possibile rischio per il feto. I corticosteroidi per uso topico devono essere utilizzati con cautela durante l'allattamento.