

## PRODEA A I CREMA 75 ML

**Marchio:** PRODEA  
**Codice Min.:** 980521304  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**PRODEA AI CREMA** DescrizionePuò essere utilizzata nel controllo e nella mitigazione del prurito, del rossore e del dolore cutaneo da ipersensibilità locale di tipo neuro-mediata nei pazienti che sono in terapia specifica con farmaci di tipo biologico o ad azione simile. L'azione avviene localmente grazie alla Polidatina estratta da Fallopia Japonica che può, ridurre in maniera selettiva e specifica i disturbi dermatologici. Nichel, cromo, molibdeno tested. Senza profumo. Senza coloranti. Modalità d'uso Sulla zona cutanea da trattare ben asciutta applicare la quantità minima di prodotto, massaggiare sino a completo assorbimento. Utilizzare almeno una volta al giorno iniziando il trattamento contestualmente all'inizio della somministrazione dei farmaci per via generale. Su eventuali parti della cute che risultino comunque infiammate ripetere l'applicazione. Proseguire il trattamento per tutta la durata delle terapie specifiche con

farmaci di tipo biologico o ad azione simile. Componenti Aqua, Glyceril stearate, Steareth-25, Ceteth-20, Stearyl alcohol, Caprylic capric triglyceride, Polydatin - (Resveratrolo glucosidato da Fallopia Japonica), Cetyl palmitate, Stearyl alcohol, Aloe barbadensis extract, Boswellia serrata, Butyrospermum Parkii Butter, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Cetyl alcohol, Octyldodecanol, Glycerin, Tocopherol acetate, Phenoxyethanol, Ethylexyglycerin, Oleyl Erucate, Dicaprylyl Ether, Xanthan gum, Ceramide NP, Ceramide AP, Ceramide EOP, Phytosphingosine, Cholesterol, Sodium Lauroyl Lactylate, Carbomer, Xanthan Gum, Sodium Carboxymethyl Betaglukan, Olea europea insaponif1ables, Lactic acid. AvvertenzeNon utilizzare se si è sensibilizzati o allergici ad almeno uno degli ingredienti evitando l'esposizione diretta alla radiazione solare. Interrompere il trattamento in caso di reazione avversa di tipo irritativo. Informare il medico o il farmacista in caso di reazioni secondarie o effetti secondari riconducibili al prodotto. Non utilizzare su piaghe, ferite aperte in via di cicatrizzazione, secernenti o in fase settica. ConservazioneConservare il prodotto a temperatura ambiente lontano da fonti di calore e ben chiuso dopo ogni applicazione. Dopo l'apertura il prodotto è stabile per 6 mesi. Validità confezionamento integro: 36 mesi. Formato 75 ml