

REPARIL*gel 40 g 1% + 5%

Marchio: REPARIL
Codice Min.: 036397014
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE REPARIL C.M. **GEL** **CATEGORIA** FARMACOTERAPEUTICA Farmaci per uso topico, per dolori articolari e muscolari. **PRINCIPI ATTIVI** 1% + 5% gel. 100 g di gel contengono: escina 1 g, dietilamina salicilato 5 g. 2% + 5% gel. 100 g di gel contengono: escina 2 g, dietilamina salicilato 5 g. **ECCIPIENTI** Lavanda essenza, arancio amaro fiore essenza, carbomeri, macrogol 6 glicerolo caprilocaprato, disodio edetato, trometamolo, alcool isopropilico, acqua depurata. **INDICAZIONI** Traumatologia minore. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Non impiegare

su lesioni aperte (ferite), mucose ed aree cutanee trattate con radiazioni. **POSOLOGIA** Adulti ed adolescenti (12-18 anni): applicare e spalmare un sottile strato sulla cute della zona da trattare da 1 a 3 volte al giorno. Applicare il gel direttamente sulla parte interessata. Dopo ogni applicazione lavarsi accuratamente le mani. Bambini al di sotto dei 12 anni: la sicurezza e l'efficacia nei bambini al di sotto dei 12 anni di eta' non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. **CONSERVAZIONE** Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. **AVVERTENZE** Non sussistono rischi di assuefazione e dipendenza. Trattandosi di un preparato per applicazioni topiche, il suo uso deve essere esclusivamente esterno. L'uso, specie prolungato, dei prodotti per uso topico puo' dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. **INTERAZIONI** Non sono state segnalate interazioni con altri medicinali. **EFFETTI INDESIDERATI** In rari casi possono comparire reazioni di ipersensibilita' come rossore, desquamazione e disidratazione della pelle. **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** In caso di gravidanza e durante l'allattamento si sconsiglia di utilizzare il gel se non sotto stretto controllo medico. E' tuttavia opportuno evitare l'uso prolungato (massimo 3 settimane) del prodotto su aree cutanee estese durante la gravidanza e l'uso sul seno durante l'allattamento.