

RINOFRENAL*soluz rinol 15 ml

Marchio: TEOFARMA
Codice Min.: 023754043
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE RINOFRENAL **CATEGORIA** FARMACOTERAPEUTICA Sostanze antiallergiche esclusi i corticosteroidi. **PRINCIPI ATTIVI** Sodio cromoglicato, clorfenamina maleato. **ECCipienti** Sodio fosfato, sodio fosfato monosodico monoidrato, metile p-idrossibenzoato, sodio edetato, propile p-idrossibenzoato, acqua distillata. **INDICAZIONI** Il farmaco e' indicato per il trattamento della sintomatologia della fase acuta delle riniti allergiche stagionali e perenni. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti. **POSOLOGIA** 1-2 spruzzi per narice 3-4 volte al giorno; non superare le dosi consigliate. Una volta ottenuta la risoluzione della sintomatologia rinitica acuta, e' consigliabile continuare il trattamento con un

preparato a base di solo sodio cromoglicato al fine di prevenire la ricomparsa dei sintomi. **CONSERVAZIONE** Non sono previste speciali precauzioni per la conservazione. **AVVERTENZE** Qualora il preparato venga assunto a dosi elevate. La specialita' va usata con cautela negli anziani, nei soggetti con anamnesi di ipertrofia prostatica e glaucoma, nonche' in caso di ulcera peptica stenose ed ostruzione del collo vescicale. Usare con cautela anche in caso di insufficienza epatica. Il farmaco 4% + 0,2% spray nasale, soluzione contiene metile p-idrossibenzoato e propile p-idrossibenzoato che possono causare reazioni allergiche (eventualmente di tipo ritardato). **INTERAZIONI** Non note. **EFFETTI INDESIDERATI** Benche' con il farmaco non si siano finora verificati, si tenga presente tuttavia che, a seguito della somministrazione di sodio cromoglicato in polvere per via inalatoria, sono stati segnalati alcuni effetti collaterali quali fenomeni di irritazione aspecifica a carico delle prime vie aeree comunemente rappresentati da vellicio faringeo, tosse, transitori episodi broncospastici che recedono prontamente e possono essere prevenuti con la somministrazione di broncodilatatori. In caso di assunzione di dosi elevate e' possibile la comparsa di effetti sistemici da antistaminici, quali sedazione e sonnolenza. Assai raramente sono stati descritti effetti indesiderati rappresentati da nausea, cefalea, orticaria, angioedema, mialgie, artralgie, infiltrati eosinofili polmonari ed intensi episodi broncospastici che possono verificarsi all'inizio o durante la terapia. Tali manifestazioni richiedono la sospensione del trattamento. **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Nelle donne in stato di gravidanza il prodotto va somministrato soltanto in caso di necessita' e sotto il controllo del medico.