

RINOGUTT*spray nasale 10 ml 1 mg/ml con eucaliptolo

Marchio: RINOGUTT
Codice Min.: 023547060
Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONE RINOGUTT 1 MG/ML SPRAY NASALE, SOLUZIONE CON EUCALIPTOLO -
FLACONE DA 10 ML CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA Simpaticomimetici, non
associati. PRINCIPI ATTIVI 1 ml di soluzione contiene: tramazolina cloridrato monoidrato 1,265 mg pari a
tramazolina 1,01 mg (10 ml contengono: tramazolina cloridrato monoidrato 12,65 mg). Eccipiente con
effetto noto: 0,2 mg di benzalconio cloruro in 1 ml (vedere paragrafo 4.4). Per l'elenco completo
degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. ECCIPIENTI Acido citrico, sodio idrossido, benzalconio cloruro,
ipromellosa, polivinilpirrolidone, glicerolo, magnesio solfato, magnesio cloruro, calcio cloruro, sodio
bicarbonato, sodio cloruro, eucaliptolo, mentolo, canfora, acqua
depurata. INDICAZIONI Decongestionante della mucosa
nasale. CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI persensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi
degli eccipienti; in particolare verso tramazolina cloridrato, benzalconio cloruro. Rinite secca, malattie
cardiache ed ipertensione arteriosa grave. Glaucoma ad angolo acuto, ipertiroidismo, ipertrofia
prostatica. Gravidanza e allattamento. Rinogutt Spray Nasale: soluzione con eucaliptolo non deve essere
impiegato dopo chirurgia cranica eseguita per via nasale. Il farmaco è controindicato nei bambini di età
inferiore ai 12 anni. POSOLOGIA Adulti e bambini oltre i 12 anni: dopo essersi soffiati il naso, nebulizzare
1-2 volte per narice ogni 6-8 ore. Non superare le dosi consigliate. In assenza di risposta terapeutica
completa entro pochi giorni, consultare il medico; in ogni caso il trattamento non deve essere protratto
per oltre 4 giorni. Il flacone deve essere utilizzato, tenendolo in senso verticale. Il flacone è dotato di una
pompetta nebulizzatrice con adattatore nasale. Per un corretto uso del prodotto attenersi a quanto
segue: attivare la pompetta a vuoto per 5 volte premendo verso il basso con le dita appoggiate ai lati
dell'adattatore. Dopo essersi soffiati il naso, tenendo la testa in posizione normale, introdurre l'adattatore
nella narice e nebulizzare. Dopo la nebulizzazione inspirare profondamente a bocca chiusa al fine di
assicurare una ripartizione della soluzione sull'intera mucosa nasale. Lo spazio vuoto sovrastante il
liquido è necessario per un perfetto funzionamento del flacone come
nebulizzatore. CONSERVAZIONE Nessuna condizione di conservazione. AVVERTENZE Per la possibilità
di assorbimento sistemico Rinogutt Spray Nasale Soluzione con eucaliptolo deve essere usato con
cautela e sotto controllo medico nei pazienti affetti da ipertensione arteriosa, da diabete mellito, da
ipertrofia prostatica, da feocromocitoma e da porfiria. Deve essere prestata cautela nei pazienti in
trattamento con inibitori MAO, antidepressivi triciclici, farmaci vasopressori e antipertensivi (vedere
sezione 4.5). Nei soggetti anziani impiegare solo dopo aver consultato il medico per il pericolo di
ritenzione urinaria. Il prodotto è riservato ad adulti e bambini oltre i 12 anni. Attenersi con scrupolo alle
dosi consigliate. Il prodotto se accidentalmente ingerito o se impiegato per un lungo periodo a dosi
eccessive, può determinare fenomeni tossici. Nei pazienti con malattie cardiovascolari e
specialmente negli ipertesi l'uso di decongestionanti nasali deve essere comunque di volta in volta

sottoposto al giudizio del medico. Il prodotto va tenuto lontano dalla portata dei bambini poiché l'ingestione accidentale può provocare grave depressione del sistema nervoso centrale con sedazione spiccata (vedere sezione 4.9). Non deve essere usato oralmente. Evitare il contatto del liquido con gli occhi per non causare irritazioni. L'uso prolungato dei vasocostrittori per uso topico nasale può alterare la normale funzione della mucosa del naso e dei seni paranasali, provocando infiammazione cronica e atrofia, inoltre può indurre anche assuefazione al farmaco. Il ripetere le applicazioni per lunghi periodi può risultare dannoso. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti topici può dare luogo a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso è necessario interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire una terapia idonea. Al cessare dell'effetto vasocostrittore del farmaco può verificarsi gonfiore della mucosa nasale (edema nasale) per iperemia reattiva. Rinogutt Spray Nasale Soluzione con eucaliptolo contiene il conservante benzalconio cloruro: questo medicinale contiene 0,2 mg di benzalconio cloruro in 1 ml (2 mg in 10 ml). L'uso prolungato può causare edema della mucosa nasale. In questo caso, deve essere usato un medicinale per uso nasale senza benzalconio cloruro. Se tali medicinali per uso nasale senza benzalconio cloruro non fossero disponibili, dovrà essere considerata un'altra forma farmaceutica.

INTERAZIONI Rinogutt Spray Nasale Soluzione con eucaliptolo non deve essere somministrato durante terapia con farmaci antidepressivi e nelle due settimane successive la somministrazione di questi ultimi. La somministrazione di Rinogutt Spray Nasale Soluzione con eucaliptolo in concomitanza a farmaci antidepressivi (inibitori MAO o antidepressivi triciclici) o a farmaci vasopressori, può provocare un aumento della pressione arteriosa. L'uso in associazione ad antidepressivi triciclici può causare anche aritmie. Le interazioni con i farmaci antipertensivi, soprattutto quelli la cui azione coinvolge il sistema nervoso simpatico, possono essere complesse e portare a vari effetti cardiovascolari.

EFFETTI INDESIDERATI La seguente convenzione è stata utilizzata per la classificazione degli effetti indesiderati: molto comune ($\geq 1/10$), comune ($\geq 1/100$, $= 1/1000$ e $= 1/10.000$) e

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Gravidanza: Rinogutt Spray Nasale Soluzione con eucaliptolo non deve essere impiegato durante il primo trimestre di gravidanza. Nel secondo e terzo trimestre di gravidanza il prodotto può essere impiegato solo su indicazione del medico. Allattamento: la sicurezza durante l'allattamento non è stata stabilita. Durante il periodo di allattamento il prodotto deve essere utilizzato solo su indicazione del medico. Fertilità: non sono stati condotti studi volti ad indagare gli effetti di Rinogutt Spray Nasale Soluzione sulla fertilità umana. Sulla base dei dati pre-clinici disponibili non ci sono indicazioni sui possibili effetti dell'uso di tramazolina cloridrato monoidrato sulla fertilità.