

RUSCOROID*crema rettale 40 g 1% + 1%

Marchio: RUSCOROID
Codice Min.: 025825023
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE RUSCOROID 10 MG/G + 10 MG/G CREMA RETTALE CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA Sostanze per il trattamento di emorroidi e ragadi anali per uso topico. PRINCIPI ATTIVI 100 g di crema contengono: ruscogenina 1 g, tetracaina cloridrato 1 g. Eccipienti con effetti noti: alcol cetilico, metile paraidrossibenzoato, etile paraidrossibenzoato, propile paraidrossibenzoato, profumo Rosemary 7144. Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. ECCIPIENTI Alcool cetilico, polisorbato 80, macrogol 400, macrogol 4000, metile paraidrossibenzoato, etile paraidrossibenzoato, propile paraidrossibenzoato, profumo

Rosemary 7144*, acqua depurata. *Profumo Rosemary 7144 contiene i seguenti allergeni: amile cinnamale, alcol amilcinnamico, benzil benzoato, citrale, citronellolo, cumarina, eugenolo, geraniolo, esilcinnamale, idrossicitronellale, d-limonene, linalolo (vedere paragrafo 4.4). INDICAZIONI Trattamento dei sintomi associati ad emorroidi, ragadi anali e proctiti, quali: prurito, dolore e senso di peso. CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI persensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1 o verso altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico. POSOLOGIA Posologia: 1 - 2 applicazioni al giorno. Non superare le dosi consigliate. Modo di somministrazione. Applicare direttamente o utilizzando l'apposito applicatore. CONSERVAZIONE Conservare a temperatura inferiore a 25 gradi C. AVVERTENZE Non utilizzare per trattamenti protratti. Dopo un breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili ed in caso di uso prolungato consultare il medico. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico puo' dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; ove cio' accada, occorre interrompere il trattamento e consultare il medico per adottare idonee misure terapeutiche. L'impiego clinico non ha messo in evidenza la necessita' di particolari cautele per l'uso di Ruscoroid. Non e' raccomandato l'impiego al di sotto dei 12 anni di eta', se non sotto diretto controllo medico. Ruscoroid 10 mg/g + 10 mg/g crema contiene alcool cetilico: puo' causare reazioni sulla pelle localizzate (ades. dermatite da contatto). Ruscoroid 10 mg/g + 10 mg/g crema contiene metile paraidrossibenzoato, etile paraidrossibenzoato, propile paraidrossibenzoato: possono causare reazioni allergiche (anche ritardate). Ruscoroid 10 mg/g + 10 mg/g crema contiene profumo Rosemary 7144: questo medicinale contiene un aroma (profumo Rosemary 7144) a sua volta contenente allergeni che possono causare reazioni allergiche. Per la composizione completa degli allergeni vedere il paragrafo 6.1. INTERAZIONI Non sono mai stati segnalati fenomeni riferibili a interazione con altre sostanze. EFFETTI INDESIDERATI Rari casi di sensibilizzazione, quali eritemi locali e generalizzati associati a prurito. Segnalazione delle reazioni

avverse sospette. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale e' importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Il prodotto va usato nei casi di effettiva necessita' sotto diretto controllo del medico.