

## SERTADIE\*1 ovulo vag 300 mg

**Marchio:** Geymonat  
**Codice Min.:** 033960016  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**DENOMINAZIONE** SERTADIE 300 MG OVULO **CATEGORIA**  
**FARMACOTERAPEUTICA** Antimicrobici ed antisettici ginecologici; derivati  
imidazolici. **PRINCIPI ATTIVI** Sertaconazolo nitrate. **ECCIPIENTI** Gliceridi  
semisintetici solidi (WITEPSOL H19), gliceridi semisintetici solidi (SUPPOCIRE  
NAI-50), silice colloidale anidra. **INDICAZIONI** Trattamento locale della candidiasi  
v a g i n a l e c l i n i c a m e n t e  
accertata. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI** Ipersensibilita' verso i  
componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico. In  
particolare verso gli antimicotici del gruppo degli imidazolici. Generalmente  
controindicato in gravidanza e nell'allattamento. **POSOLOGIA** Introdurre l'ovulo  
profondamente in vagina, preferibilmente in posizione supina, la sera al momento

di coricarsi. Il trattamento prevede una somministrazione unica. In caso di persistenza della  
sintomatologia, un secondo ovulo potra' essere introdotto a distanza di 7 giorni. **CONSERVAZIONE** Non  
conservare al di sopra di 30 gradi C. **AVVERTENZE** Nel caso di candidiasi coinvolgente anche le aree  
vulvare e/o perianale, si consiglia di associare alla terapia con sertaconazolo in ovuli per uso vaginale il  
trattamento locale con un altro antimicotico. Al fine di prevenire reinfezioni con meccanismo cosiddetto a  
ping-pong, risulta indispensabile anche il trattamento del partner con antimicotici. Per l'igiene locale si  
consiglia l'uso di saponi a pH neutro o alcalino, in quanto saponi a pH acido possono favorire la  
proliferazione della Candida. In caso di intolleranza locale o di reazione allergica, il trattamento dovra'  
essere interrotto e la rimozione del prodotto residuo potra' essere effettuata mediante irrigazioni vaginali.  
L'uso del prodotto puo' interferire sull'efficacia dei dispositivi contraccettivi in latex (preservativi e  
diaframmi) poiche' puo' causarne la rottura. Il prodotto puo' essere utilizzato anche nel periodo  
mestruale. **INTERAZIONI** Si sconsiglia l'uso concomitante di spermicidi, in quanto il prodotto puo' ridurre  
o inattivarne l'attivita' contraccettiva. **EFFETTI INDESIDERATI** Raramente sono state riferite  
manifestazioni di intolleranza locale, quali sensazione di bruciore o di prurito, risoltesi, in genere,  
spontaneamente. Sono possibili fenomeni di allergia. Raramente e' stato riportato un aumento degli  
enzimi epatici. **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Gli antimicotici imidazolici, nonostante il loro minimo  
assorbimento sistemico, non sono generalmente raccomandati durante la gravidanza essendo stati  
riportati in studi animali effetti indesiderati sul feto. Tuttavia gli studi effettuati con il sertaconazolo su  
diverse specie animali non hanno evidenziato effetti embriotossici e/o teratogeni. Non esistono studi  
adeguati e ben controllati sull'uso del medicinale in gravidanza o nell'allattamento. Pertanto il medicinale  
deve essere usato solo in caso di necessita', dopo aver valutato il beneficio atteso per la madre in  
rapporto al possibile rischio per il feto o per il lattante.