

SOBREFRI*20 flaconcini 40 mg 5 ml sciroppo

Marchio: SOBREFRI
Codice Min.: 040570018
Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONE SOBREFRI 40 MG/5 ML SCIROPPO **CATEGORIA** FARMACOTERAPEUTICA Mucolitici. **PRINCIPI ATTIVI** SOBREFRI 40 mg/5 ml sciroppo monodose. Un contenitore monodose contiene: sobrerolo 40 mg. SOBREFRI 40 mg/5 ml sciroppo 5 ml di sciroppo contengono: sobrerolo 40 mg. **ECCIPIENTI** Sciroppo monodose: maltisorb (Maltitolo 75%), glicerolo 98%, sodio fosfato monobasico, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili. Sciroppo multidose 200 ml: maltisorb (Maltitolo 75%), glicerolo 98%, sodio fosfato monobasico, sodio idrossido, metil p-idrossibenzoato, propil p-idrossibenzoato, acqua per preparazioni iniettabili. **INDICAZIONI** Il farmaco si usa per il trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI** Il farmaco e' controindicato nei bambini di eta' inferiore ai 2 anni. Ipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. **POSOLOGIA** Sciroppo: usare come riferimento le tacche presenti sul misurino dosatore. Bambini oltre i 2 anni: 10 ml 2 volte al di'. Adulti: 10-20 ml 2 volte al di'. **CONSERVAZIONE** Sciroppo: nessuna particolare precauzione per la conservazione. **AVVERTENZE** I mucolitici possono indurre ostruzione bronchiale nei bambini di eta' inferiore ai 2 anni. Infatti la capacita' di drenaggio del muco bronchiale e' limitata in questa fascia di eta', a causa delle caratteristiche fisiologiche delle vie respiratorie. Essi non devono quindi essere usati nei bambini di eta' inferiore ai 2 anni. Avvertenze relative ad alcuni eccipienti. Per la presenza di maltitolo, i pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio non devono assumere questo medicinale. Questo medicinale contiene 0,29 mmol di sodio in 5 ml, cioe' oltre 1 mmol di sodio per 20 ml. Da tenere in considerazione in persone che seguono una dieta a basso contenuto di sodio. Lo sciroppo multidose contiene anche metile p-idrossibenzoato e propile p-idrossibenzoato che possono provocare reazioni allergiche (anche di tipo ritardato). **INTERAZIONI** Non sono note interazioni del sobrerolo con altri farmaci. **EFFETTI INDESIDERATI** Possono verificarsi disturbi gastrici e nausea. Puo' verificarsi ostruzione bronchiale con frequenza sconosciuta. **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** In gravidanza e nell'allattamento la sicurezza di sobrerolo non e' sufficientemente dimostrata; pertanto il farmaco va somministrato solo quando, a giudizio del medico, i potenziali benefici superano i rischi possibili.