

## SOLUMAG\*20 bust polv orale 2,25 g

**Marchio:** SOLUMAG  
**Codice Min.:** 028057026  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)

**DENOMINAZIONE**SOLUMAG 2,25 G POLVERE PER SOLUZIONE ORALE**CATEGORIA**  
**FARMACOTERAPEUTICA**Integratori minerali.**PRINCIPI ATTIVI**Pidolato di  
magnesio.**ECCIPIENTI**Saccarosio; acido citrico anidro; saccarina sodica; aroma arancio.**INDICAZIONI**In  
neurologia e pediatria: quadri clinici espressione di uno stato di ipereccitabilità del sistema nervoso  
centrale e periferico, sostenuta da una carenza di magnesio. In ostetricia: vomito, insonnia, irritabilità,  
crampi muscolari, contrazioni dolorose dell'utero, eclampsia.**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**Grave insufficienza renale; ipersensibilità al  
principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti; da non somministrare nei soggetti in terapia  
digitalica.**POSOLOGIA**Secondo prescrizione Medica. La posologia consigliata è di una bustina due  
volte al giorno (per un totale di 4,5 g di pidolato di magnesio/ die). Sciogliere il contenuto della bustina in  
mezzo bicchiere d'acqua.**CONSERVAZIONE**Questo medicinale non richiede alcuna condizione  
particolare di conservazione.**AVVERTENZE**In caso di persistenza dei sintomi o di un loro aggravamento  
rivolgersi al proprio medico. In pazienti con insufficienza renale è necessario ridurre la posologia e  
monitorare la funzionalità renale e la magnesemia. È opportuno considerare la possibilità che si  
verifichi, in corso di trattamento, depressione dell'attività cardiovascolare e respiratoria. Contiene  
saccarosio.**INTERAZIONI**La somministrazione di magnesio può determinare un ridotto assorbimento  
delle tetracicline e pertanto si consiglia di non somministrare il farmaco contemporaneamente a  
medicinali a base di tetracicline, ma a 3- 4 ore di distanza tra le somministrazioni. I chinoloni devono  
essere somministrati almeno 2 ore prima o 6 ore dopo la somministrazione di prodotti a base di  
Magnesio per evitare interferenze con il loro assorbimento. Nel caso di concomitante somministrazione  
di magnesio e colecalciferolo si consiglia inoltre il controllo della calcemia, onde evitare la possibilità di  
episodi ipercalcemici. Si sconsiglia l'uso concomitante di preparati contenenti sali di calcio o fosfato  
poiché tali prodotti impediscono l'assorbimento del magnesio. L'assunzione contemporanea di prodotti a  
base di magnesio con farmaci deprimenti il Sistema Nervoso Centrale può potenziare gli effetti sul SNC  
del magnesio ed deve essere valutata attentamente.**EFFETTI INDESIDERATI**Rari disturbi digestivi;  
diarrea; dolori addominali. Sono stati segnalati casi eccezionali di intolleranza individuale allo ione, che  
possono essere trattati con antistaminici per via orale o parenterale.**GRAVIDANZA E  
ALLATTAMENTO**È consigliabile che in gravidanza e allattamento l'assunzione del farmaco avvenga nei  
casi di effettiva necessità'.