

SOLUZIONE SCHOUM*orale soluz 550 g

Marchio: SOLUZIONE SCHOUM
Codice Min.: 004975013
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE SOLUZIONE SCHOUM SOLUZIONE ORALE **CATEGORIA** FARMACOTERAPEUTICA Urologici associazioni varie. **PRINCIPI ATTIVI** Sol.schoum contiene i seguenti principi attivi. Fumaria estratto idroalcolico (titolo in protopina non meno di 0,02%): 0,0104 g; ononide estratto idroalcolico (titolo in formononetina non meno di 0,005%): 0,0120 g; piscidia estratto idroalcolico (titolo in jamaicina non meno di 0,005%): 0,0016 g; glicerolo: 10,70 g. Sol schoum forte contiene i seguenti principi attivi. Fumaria estratto idroalcolico (titolo in protopina non meno di 0,02%): 0,0229 g; ononide estratto idroalcolico (titolo in formononetina non meno di 0,005%): 0,0264 g; piscidia estratto idroalcolico (titolo in jamaicina non meno di 0,005%): 0,0035 g; glicerolo: 23,540 g. **Eccipienti con effetti noti:** miscela di esteri dell'acido p-idrossibenzoico, alcool

etilico, fruttosio. Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. **ECCIPIENTI** Miscela di esteri dell'acido p-idrossibenzoico, alcool etilico, fruttosio, isoamile acetato, menta essenza solubile, E 104, sodio deidroacetato, acqua depurata. **INDICAZIONI** Coadiuvante negli stati spastici e dolorosi delle vie biliari e delle vie urinarie. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Per la presenza di alcool etilico, Soluzione Schoum e Soluzione Schoum Forte sono controindicate in caso di gravidanza e allattamento e in caso di insufficienza epatica severa. **POSOLOGIA** Non superare le dosi consigliate. Soluzione Schoum. Adulti: un bicchierino (g 50) 4-6 volte al giorno; bambini: mezzo bicchierino (g 25) 1-2 volte al giorno. La dose va assunta preferibilmente lontano dai pasti. Soluzione Schoum Forte. Adulti: 2 cucchiaini da tavola, 4-6 volte al giorno; bambini: 1 cucchiaino da tavola, 1-2 volte al giorno. La dose va diluita con altrettanta acqua e assunta preferibilmente lontano dai pasti. **CONSERVAZIONE** Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. **AVVERTENZE** La presenza di precipitato fioccoso non indica alterazione del prodotto. Soluzione Schoum e Soluzione Schoum Forte contengono alcool etilico in quantita' superiore a 100 mg per dose. Puo' essere dannoso per gli alcolisti. Da tenere in considerazione nelle donne in gravidanza o in allattamento, nei bambini e nei gruppi ad alto rischio come le persone affette da patologie epatiche o epilessia. Per chi svolge attivita' sportiva, l'uso di medicinali contenenti alcool etilico puo' determinare positivita' ai tests antidoping in rapporto ai limiti di concentrazione alcolemica indicata da alcune federazioni sportive. Soluzione Schoum e Soluzione Schoum Forte contengono fruttosio. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio non devono assumere questo medicinale. Soluzione Schoum e Soluzione Schoum Forte contengono esteri dell'acido p-idrossibenzoico. Possono causare reazioni allergiche, anche ritardate. **INTERAZIONI** Per la presenza di alcool etilico, si sconsiglia la contemporanea assunzione di bevande alcoliche. **EFFETTI INDESIDERATI** Non noti. Segnalazione delle reazioni avverse sospette. La segnalazione delle reazioni

avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale e' importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: <http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili>. GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Soluzione Schoum e Soluzione Schoum Forte contengono alcool etilico in quantita' superiore a 100 mg per dose; la loro somministrazione e' pertanto controindicata in caso di gravidanza e allattamento (vedere paragrafo 4.3).