

SOMATOLINE 0.1+0.3% EMULSIONE CUTANEA 30 BUSTINE

Marchio: Somatoline
Codice Min.: 022816021
Link: [clicca qui per acquistare](#)

SOMATOLINE 0.1+0.3% EMULSIONE CUTANEA 30 BUSTINE



Questo prodotto è un farmaco senza obbligo di ricetta (OTC - SOP), è importante leggere sempre il foglietto illustrativo e le avvertenze prima dell'utilizzo.

DENOMINAZIONE:
SOMATOLINE 0,1% + 0,3% EMULSIONE CUTANEA

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA:
Preparati dermatologici.

PRINCIPI ATTIVI:

100 g di emulsione contengono: levotiroxina 100 mg escina 300 mg.

ECCIPIENTI:

Glicerilmonostearato A.E., gomma xantana, paraffina liquida, decilolea to, sorbitolo 70% non cristallizzabile, poliacrilamide isoparaffin lau reth-7, imidazolidinilurea, metile para-idrossibenzoato, propile paraidrossibenzoato, acido citrico monoidrato, profumo rose, acqua depurat a.

INDICAZIONI:

Stati di adiposita' localizzata accompagnati da cellulite.

Indicato ne gli adulti.

CONTROINDICAZIONI/EFF.SECONDARI:

Ipersensibilita' ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipient i.

Intolleranza allo iodio.

Generalmente controindicato in gravidanza e durante l'allattamento.

POSOLOGIA:

Bustine: applicare localmente 20 g di prodotto al giorno (pari a 2 bus tine) per i primi due giorni consecutivi, quindi 10 g di prodotto (par i a 1 bustina) al giorno o a giorni alterni.

Se il prodotto deve esser e utilizzato sulle cosce, applicare per i primi due giorni 1 bustina (10 g) per ogni coscia.

I giorni successivi mezza bustina (5 g) per coscia.

Flacone multidose con dosatore: (4 erogazioni corrispondono a 10 g di prodotto).

Applicare localmente 20 g di prodotto al giorno (pari a 8 erogazioni) per i primi due giorni, quindi 10 g di prodotto (pari a 4 erogazioni) al giorno o a giorni alterni.

Se il prodotto deve essere utilizzato sulle cosce, applicare per i primi due giorni una dose corrispondente a 4 erogazioni (10 g) per ogni coscia.

I giorni successivi 2 erogazioni (5 g) per coscia.

Per ottenere 1 erogazione pigiare fino in fondo il dosatore.

Ogni ciclo di trattamento può andare da un minimo di 15 - 20 giorni ad un massimo di 2 - 3 mesi e può essere ripetuto a vario intervallo di tempo.

Massaggiare il prodotto nella zona da trattare (la cui superficie non deve, di regola, superare i 15 cm di lato), fino a completo assorbimento.

Far seguire un secondo massaggio più profondo, della durata di alcuni minuti (5'-10').

Qualora la cute sia grassa od ispessita, si consiglia di lavare dapprima la zona da trattare, asciugare bene e poi praticare un semplice massaggio fino a produrre un lieve arrossamento; procedere quindi all'applicazione e del trattamento; i risultati clinici cominciano a farsi evidenti, in genere, verso la fine della seconda settimana di trattamento.

La sicurezza e l'efficacia nei bambini e negli adolescenti non sono state ancora dimostrate.

Non ci sono dati disponibili.

CONSERVAZIONE:

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

AVVERTENZE:

L'uso, specie se ripetuto o protratto di prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione.

Ove ciò si verifici interrompere il trattamento e valutare la necessità di istituire un'adeguata terapia.

Non utilizzare in vicinanza delle mucose.

Contiene para-iodossibenzoati che possono provocare reazioni allergiche (anche ritardate).

INTERAZIONI:

Non sussistono fenomeni di intolleranza o di incompatibilità con altri farmaci.

EFFETTI INDESIDERATI:

Molto raramente sono stati segnalati casi con sintomi riconducibili ad alterata funzionalità tiroidea.

Segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO:

Non si conoscono dati sperimentali o clinici che depongano contro l'uso del prodotto in gravidanza.

Comunque la prudenza sconsiglia di applicare il prodotto durante la gravidanza o durante l'allattamento.