

## SOMATOLINE\*emuls cutanea 15 bust 0,1% + 0,3%

**Marchio:** SOMATOLINE  
**Codice Min.:** 022816072  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**DENOMINAZIONE** SOMATOLINE 0,1% + 0,3% EMULSIONE CUTANEA  
**CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA** Preparati dermatologici.  
**PRINCIPI ATTIVI** 100 g di emulsione contengono: levotiroxina 100 mg escina 300 mg.  
**ECCIPIENTI** Glicerilmonostearato A.E., gomma xantana, paraffina liquida, deciloleato, sorbitolo 70% non cristallizzabile, poliacrilamide isoparaffin laureth-7, imidazolidinilurea, metile para-idrossibenzoato, propile para-idrossibenzoato, acido citrico monoidrato, profumo rose, acqua depurata.  
**INDICAZIONI** Stati di adiposita' localizzata accompagnati da cellulite. Indicato negli adulti.  
**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' ai

principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Intolleranza allo iodio. Generalmente controindicato in gravidanza e durante l'allattamento.  
**POSOLOGIA** Bustine: applicare localmente 20 g di prodotto al giorno (pari a 2 bustine) per i primi due giorni consecutivi, quindi 10 g di prodotto (pari a 1 bustina) al giorno o a giorni alterni. Se il prodotto deve essere utilizzato sulle cosce, applicare per i primi due giorni 1 bustina (10 g) per ogni coscia. I giorni successivi mezza bustina (5 g) per coscia. Flacone multidose con dosatore: (4 erogazioni corrispondono a 10g di prodotto). Applicare localmente 20 g di prodotto al giorno (paria 8 erogazioni) per i primi due giorni, quindi 10 g di prodotto (paria 4 erogazioni) al giorno o a giorni alterni. Se il prodotto deve essere utilizzato sulle cosce, applicare per i primi due giorni una dose corrispondente a 4 erogazioni (10 g) per ogni coscia. I giorni successivi 2 erogazioni (5 g) per coscia. Per ottenere 1 erogazione pigiare fino in fondo il dosatore. Ogni ciclo di trattamento puo' andare da un minimo di 15 - 20 giorni ad un massimo di 2 - 3 mesi e puo' essere ripetuto a vario intervallo di tempo. Massaggiare il prodotto nella zona da trattare (la cui superficie non deve, di regola, superare i 15 cm dilatato), fino a completo assorbimento. Far seguire un secondo massaggio piu' profondo, della durata di alcuni minuti primi (5'-10'). Qualora la cute sia grassa od ispessita, si consiglia di lavare dapprima la zona da trattare, asciugare bene e poi praticare un semplice massaggio fino a produrre un lieve arrossamento; procedere quindi all'applicazione del trattamento; i risultati clinici cominciano a farsi evidenti, in genere, verso la fine della seconda settimana di trattamento. La sicurezza e l'efficacia nei bambini e negli adolescenti non sono state ancora dimostrate. Non ci sono dati disponibili.  
**CONSERVAZIONE** Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.  
**AVVERTENZE** L'uso, specie se ripetuto o protratto di prodotti per uso topico puo' dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. Ove cio' si verifici interrompere il trattamento e valutare la necessita' di istituire un'idonea terapia. Non utilizzare in vicinanza delle mucose. Contiene para-idrossibenzoati che possono provocare reazioni allergiche (anche ritardate).  
**INTERAZIONI** Non

sussistono fenomeni di intolleranza o di incompatibilità con altri farmaci. EFFETTI INDESIDERATI Molto raramente sono stati segnalati casi con sintomi riconducibili ad alterata funzionalità tiroidea. Segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Non si conoscono dati sperimentali o clinici che depongano contro l'uso del prodotto in gravidanza. Comunque la prudenza consiglia di applicare il prodotto durante la gravidanza o durante l'allattamento.