SORBICLIS*AD 1 clisma 120 ml 36 g + 0,24 g soluz rett

Marchio:	SORBICLIS
Codice Min.:	011825015
Link:	clicca qui per acquistare

DENOMINAZIONESORBICLISCATEGORIA FARMACOTERAPEUTICAFarmaci per la costipazione.PRINCIPI ATTIVIAdulti 100 ml contengono sorbitolo al 70% non cristallizzabile 30,000g, dioctilsodiosulfosuccinato 0,200 g. Pediatrico. 100 ml contengono:sorbitolo al 70% non cristallizzabile 10,000 g; dioctilsodiosulfosuccinato 0,008 g.ECCIPIENTIMetile p-idrossibenzoato sodico; acqua depurata.INDICAZIONIStitichezza.CONTROINDICAZIONI/EFF.SECONDARIpersensibilita' verso i componenti del prodotto. Affezioni ano-rettali con lesioni della mucosa. Ostruzione meccanica delle vie biliari. Insufficienza epatica. Calcolosi biliare.POSOLOGIATutto il contenuto del flacone per un clistere. Modalita' di aperturadel flacone: premere a fondo il copricannula in modo da forare la membrana del sigillo. Non superare la dose consigliata.CONSERVAZIONENessuna speciale precauzione per la conservazione.AVVERTENZEL'uso continuativo dei lassativi puo' provocare assuefazione o danno di diverso tipo. Non usare per trattamenti protratti. Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. Sela costipazione e' ostinata consultare il medico. Non usare lassativise sono presenti dolori addominali, nausea e vomito.INTERAZIONIQuesto prodotto non va usato insieme a paraffina liquida, ad altri medicamenti ed a olio minerale o lassativi che lo contengono.EFFETTI INDESIDERATIIl prodotto e' ben tollerato. Non sono stati segnalati fenomeni di intolleranza ne' di fastidio all'applicazione. Solo nei bambini, occasionalmente, puo' riscontrarsi transitoria incontinenza con espulsione rapida dell'inoculo. Nel caso insorgessero effetti indesiderati non descritti nel presente foglio illustrativo rivolgersi al medico o al farmacista.GRAVIDANZA E ALLATTAMENTOUsare solo in caso di effettiva necessita', sotto il diretto controllodel medico.