

SORBICLIS*BB monod 120 ml 12 g + 0,0096 g soluz rett

Marchio: SORBICLIS
Codice Min.: 011825027
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONESORBICLIS**CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA**Farmaci per la costipazione.**PRINCIPI ATTIVI**Adulti 100 ml contengono sorbitolo al 70% non cristallizzabile 30,000g, dioctilsodiosulfosuccinato 0,200 g. Pediatrico. 100 ml contengono:sorbitolo al 70% non cristallizzabile 10,000 g; dioctilsodiosulfosuccinato 0,008 g.**ECCIPIENTI**Metile p-idrossibenzoato sodico; a c q u a depurata.**INDICAZIONI**Stitichezza.**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' verso i componenti del prodotto. Afezioni ano-rettali con lesioni della mucosa. Ostruzione meccanica delle vie biliari. Insufficienza epatica. Calcolosi biliare.**POSOLOGIA**Tutto il contenuto del flacone per un clistere. Modalita' di aperturadel flacone: premere a fondo il copricannula in modo da forare la

membrana del sigillo. Non superare la dose consigliata.**CONSERVAZIONE**Nessuna speciale precauzione per la conservazione.**AVVERTENZE**L'uso continuativo dei lassativi puo' provocare assuefazione o danno di diverso tipo. Non usare per trattamenti protratti. Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. Sela costipazione e' ostinata consultare il medico. Non usare lassativise sono presenti dolori addominali, nausea e vomito.**INTERAZIONI**Questo prodotto non va usato insieme a paraffina liquida, ad altri medicinali ed a olio minerale o lassativi che lo contengono.**EFFETTI INDESIDERATI**Il prodotto e' ben tollerato. Non sono stati segnalati fenomeni di intolleranza ne' di fastidio all'applicazione. Solo nei bambini, occasionalmente, puo' riscontrarsi transitoria incontinenza con espulsione rapida dell'inoculo. Nel caso insorgessero effetti indesiderati non descritti nel presente foglio illustrativo rivolgersi al medico o al farmacista.**GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO**Usare solo in caso di effettiva necessita', sotto il diretto controllo del medico.