

STILLA DELICATO*collirio 10 ml 20 mg/100 ml

Marchio: STILLA
Codice Min.: 032139014
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE STILLA DELICATO 0.02%
C O L L I R I O C A T E G O R I A
FARMACOTERAPEUTICA Antimicrobici. PRINCIPI ATTIVI 100 ml
contengono benzalconio cloruro al 0,02%. ECCIPIENTI Calcio
disodio edetato, sodio fosfato monobasico monoidrato, sodio
fosfato bibasico dodecaidrato, sodio cloruro, guaiazulene, acqua
di arancio concentrata, acqua di rose concentrata, Hamamelis
Virginiana estratto, polisorbato, acqua distillata
q.b. INDICAZIONI Disinfezione dell'occhio; anche in occhi
affaticati ed irritati da agenti esterni (fumo, polvere
etc.). CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI ipersensibilita'

verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico. POSOLOGIA Una o due gocce in ciascun occhio, 3-4 volte al giorno. Non superare le dosi consigliate, escluso diverso parere del medico. CONSERVAZIONE Nessuna speciale precauzione per la conservazione. Il prodotto non deve essere usato oltre 28 giorni dopo la prima apertura del contenitore. AVVERTENZE Non usare per trattamenti prolungati. Se i disturbi persistono o si aggravano dopo qualche giorno di trattamento o insorgono sintomi di intolleranza individuale, consultare il medico. L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti puo' avere conseguenze gravi, talvolta fatali. Il prodotto e' solo per uso esterno. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico puo' dare origine a fenomeni di sensibilizzazione, in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire idonea terapia. Non usare con lenti a contatto; lasciar trascorrere 15 minuti tra le applicazioni del collirio edelle lenti a contatto. INTERAZIONI Non sono note interazioni negative con altri farmaci, comunque e' consigliabile evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici. EFFETTI INDESIDERATI Raramente possono manifestarsi fenomeni di ipersensibilita'. GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Non esistono controindicazioni all'uso topico del benzalconio in gravidanza o durante l'allattamento.