

## STIPSIGOL 30 BUSTINE MONOUSO 10 G

**Marchio:** AURORA  
**Codice Min.:** 976730996  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



Stpsigol BustineAD AZIONE LASSATIVA Descrizione Dispositivo medico in polvere per sospensione orale estemporanea utile nel trattamento della stitichezza cronica. Attraverso un'azione di tipo osmotico, regolarizza l'intestino in modo naturale. Non viene assorbito né fermenta nell'intestini, non irrita la mucosa e viene eliminato nelle feci in forma non modificata. È particolarmente indicato nella stitichezza cronica e nei casi di intestino occasionalmente irregolare. Grazie infatti alla sua affinità per l'acqua, ammorbidisce le feci facilitando l'evacuazione senza provocare crampi né dolore addominale, né condizioni di urgenza. La sua efficacia non si riduce nel tempo. Modalità d'uso Salvo diversa prescrizione medica, è consigliabile utilizzare Stipsigol secondo le seguenti modalità: Da 6 mesi a 2 anni (fino a

12 kg): 1 bustina al giorno. Da 2 a 11 anni (da 12 kg a 20 kh): 1-2 bustine al giorno. Adulti e bambini al di sopra di 11 anni (o >20 kg): 1-3 bustine al giorno. La dose può essere aumentata o diminuita a seconda della risposta individuale al trattamento. La posologia giornaliera più corretta è da decidere in base al peso e alla severità della stipsi. Si consiglia in ogni caso di sentire il parere del medico. Utilizzare il prodotto in età pediatrica solo dopo consiglio medico. La dose massima necessaria non supera normalmente i 30 g di prodotto al giorno. Sciogliere una busta (10 g) in circa 1 bicchiere d'acqua (circa 125 ml). È possibile suddividere la dose giornaliera in più somministrazioni. Componenti Ogni bustina monouso contiene 10 g di macrogol 3.350. Eccipienti: biossido di silicio, aroma, saccarina sodica. Avvertenze Potrebbero apparire soprattutto in fase iniziale di utilizzo disturbi gastro-intestinali (dolore addominale, borborigmi, diarrea o perdite di feci), oltre a nausea, vomito di grado lieve, distensione addominale, flatulenza, infiammazione e irritazione perianale, effetti che normalmente migliorano riducendo la dose. Molto raramente si sono osservate reazioni allergiche, compresa l'anafilassi. Altri sintomi di reazioni allergiche come prurito, orticaria e dispnea. In caso di persistenza degli effetti collaterali sospendere il trattamento e rivolgersi al proprio medico per un consulto. Conservare il dispositivo e l'eventuale soluzione ottenuta lontano dalla portata dei bambini. Non utilizzare il dispositivo dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. Non utilizzare i caso di confezione danneggiata. Non superare assolutamente le dosi consigliate: in caso di sovradosaggio possono manifestarsi dolori intensi, distensione addominale. Possono inoltre sopraggiungere diarree indotte, con disturbi elettrolitici causati da un'eventuale eccessiva evacuazione. In caso di sospetto sovradosaggio rivolgersi immediatamente al proprio medico. Non usare per più di 30 giorni consecutivi, se i sintomi persistono consultare il medico. Durante il trattamento con Stipsigol è consigliabile seguire una dieta adeguata, accompagnata dalla somministrazione di una soluzione per la reidratazione orale (ORS) per evitare la disidratazione, si consiglia comunque di consultare il medico. Non utilizzare al di

sotto dei 6 mesi. L'assunzione del dispositivo è sconsigliata in caso di: perforazione o ostruzione intestinale dovuta a disordini strutturali o funzionali della parete intestinale, dell'ileo, gravi patologie infiammatorie del tratto intestinale, come morbo di Chron, colite ulcerosa e megacolon tossico. Ipersensibilità nota al macrogol (polietilenglicole). Non utilizzare in caso di presenza di lesioni gastriche o intestinali note. Ogni bustina è monouso e deve essere aperta solo al momento dell'utilizzo. Non assumere il dispositivo medico durante l'uso di altri dispositivi o specialità medicinali orali: il potere osmotico del macrogol e l'aumento della velocità di transito gastrointestinale indotta possono influire negativamente sulla loro efficacia. Consultare in ogni caso il proprio medico prima di assumere Stipsigol bustine in caso di altre terapie in atto. In gravidanza o allattamento assumere Stipsigol bustine solo dopo aver consultato il medico. L'assunzione del prodotto deve essere distanziata di almeno 2 ore da quella dei farmaci somministrati per via orale. Conservazione Conservare la confezione integra in luogo asciutto e al riparo da fonti luminose o di calore dirette. Conservare il dispositivo al di sotto dei 25°C. Formato 30 bustine. Peso netto: 10 g.