

STIPSIGOL 300 G

Marchio: AURORA
Codice Min.: 976322685
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Stipsigol Descrizione Dispositivo medico ad azione lassativa che, attraverso un'azione di tipo osmotico, regolarizza l'intestino in modo naturale. Non viene assorbito né fermenta nell'intestino, non irrita la mucosa e viene eliminato nelle feci in forma non modificata. È particolarmente indicato nella stitichezza cronica e nei casi di intestino occasionalmente irregolare. Grazie infatti alla sua affinità per l'acqua, ammorbidisce le feci facilitando l'evacuazione senza provocare crampi né dolore addominale, né condizioni di urgenza. La sua efficacia non si riduce nel tempo. Ingredienti Macrogl 3350; eccipienti: biossido di silicio, aroma, saccarina sodica. Caratteristiche nutrizionali Valori medi1 flacone Macrogl 3350300 g Modalità d'uso Salvo diversa prescrizione medica, è consigliabile utilizzare Stipsigol secondo le seguenti

modalità. Da 6 mesi a 2 anni (fino a 12 kg): 0,8 g di prodotto per kg di peso corporeo al giorno. Da 2 a 11 anni (da 12 kg a 20 kg): 1 g di prodotto per kg di peso corporeo al giorno. Adulti e bambini al di sopra di 11 anni (>20 kg): 10-30 g di prodotto al giorno. La dose può essere aumentata o diminuita a seconda della risposta individuale al trattamento. Si consiglia in ogni caso di sentire il parere del medico. Utilizzare il prodotto nei bambini in età pediatrica solo dopo consiglio medico. La posologia giornaliera più corretta è da decidere in base al peso del bambino e alla severità della stipsi. La dose massima necessaria non supera normalmente i 30 g di prodotto al giorno. È possibile suddividere la dose giornaliera in più somministrazioni. In base alla posologia sopra indicata, prelevare il quantitativo di prodotto con l'ausilio del misurino dotato di tacche che permettono di dosare 2,5 g (prima tacca) e 5 g (misurino raso) di prodotto. Sciogliere il quantitativo di prodotto come riportato di seguito. 1/2 misurino: 2,5 g di macrogl, 1/4 di bicchiere d'acqua (circa 30 ml); 1 misurino: 5 g di macrogl, 1/2 di bicchiere d'acqua (circa 62,5 ml); 2 misurini: 10 g di macrogl, 1 bicchiere d'acqua (circa 125 ml). Avvertenze Potrebbero apparire soprattutto in fase iniziale di utilizzo disturbi gastro-intestinali (dolore addominale, borborigmi, diarrea o perdita di feci), oltre a nausea, vomito di grado lieve, distensione addominale, flatulenza, infiammazione e irritazione perianale, effetti che normalmente migliorano riducendo la dose. Molto raramente si sono osservate reazioni allergiche, compresa l'anafilassi. Altri sintomi di reazioni allergiche come prurito, orticaria e dispnea. In caso di persistenza degli effetti collaterali sospendere il trattamento e rivolgersi al proprio medico per un consulto. Conservare il dispositivo e l'eventuale soluzione ottenuta lontano dalla portata dei bambini. In gravidanza o allattamento assumere solo dopo aver consultato il medico. Non utilizzare il dispositivo dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. Non utilizzare in caso di confezione danneggiata. Non superare assolutamente le dosi consigliate: in caso di sovradosaggio possono manifestarsi dolori intensi, distensione addominale. Possono inoltre sopraggiungere diarree indotte, con disturbi elettrolitici causati da un eventuale

eccessiva evacuazione. In caso di sospetto sovradosaggio rivolgersi immediatamente al proprio medico. Non usare per più di 30 giorni, se i sintomi persistono consultare il medico. Durante il trattamento è consigliabile seguire una dieta adeguata, accompagnata dalla somministrazione di una soluzione per la reidratazione orale (ORS) per evitare la disidratazione, si consiglia comunque di consultare il medico. Non utilizzare al di sotto dei 6 mesi. L'assunzione del dispositivo è sconsigliato in caso di perforazione o ostruzione intestinale dovuta a disordini strutturali o funzionali della parete intestinale, dell'ileo, gravi patologie infiammatorie del tratto intestinale, come morbo di Crohn, colite ulcerosa e megacolon tossico. Ipersensibilità nota al macrogol (polietilenglicole). Non utilizzare in caso di presenza di lesioni gastriche o intestinali note. Non assumere il dispositivo medico durante l'uso di altri dispositivi o specialità medicinali orali: il potere osmotico del macrogol e l'aumento della velocità di transito gastrointestinale indotta possono influire negativamente sulla loro efficacia. Consultare in ogni caso il proprio medico prima di assumere Stipsigol in caso di altre terapie in atto. Conservazione Conservare la confezione integra in un luogo asciutto e al riparo da fonti luminose o di calore dirette. Conservare il dispositivo al di sotto dei 25°C. Formato Flacone da 300 g