

SUADIAN*soluz cutanea 30 ml 1 % con nebulizzatore

Marchio: SUADIAN
Codice Min.: 028480046
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE SUADIAN CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA Antimicotici per uso topico. **PRINCIPI ATTIVI SUADIAN crema.** 1 g di crema contiene; principio attivo: naftifina cloridrato mg 10. **Eccipienti con effetti noti:** alcol cetilico e alcol stearilico. **SUADIAN soluzione cutanea.** 1 ml di soluzione contiene; principio attivo: naftifina cloridrato mg 10. **Eccipiente con effetti noti:** propilenglicole. Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. **ECCIPIENTI SUADIAN crema:** sodio idrossido, alcool benzilico, sorbitano monostearato, cetilpalmitato, alcool cetilico, alcool stearilico, polisorbato 60, isopropilmiristato, acqua depurata. **SUADIAN soluzione cutanea:** propilenglicole, alcool etilico, acqua depurata. **INDICAZIONI** Infezioni micotiche della cute (dermatomicosi) e delle unghie (onicomicosi), causate da dermatofiti, lieviti,

muffe. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. **POSOLOGIA**Il prodotto va applicato normalmente una sola volta al giorno (alla sera). E' tuttavia possibile, qualora il medico lo ritenga opportuno, applicare il prodotto 2 volte al giorno (mattino e sera). Prima dell'applicazione le aree colpite vanno accuratamente deterse e lasciate asciugare. La crema va applicata in strato sottile sulla cute infetta e sull'area circostante e fatta penetrare con un lieve massaggio. Nel caso di infezioni degli spazi intertriginosi (spazi interdigitali, pieghe gluteali, inguinali, sottomammarie), lo strato applicato puo' essere protetto con una garza, particolarmente nel corso della notte. La crema e' indicata per il trattamento delle micosi localizzate nelle pieghe cutanee e sulla cute glabra o con scarsa copertura pilifera. La soluzione con nebulizzatore e' indicata per il trattamento di infezioni cutanee particolarmente estese, anche se localizzate al cuoio capelluto o interessanti zone pilifere. **Durata del trattamento:** il miglioramento dei sintomi clinici si verifica in genere entro pochi giorni; tuttavia, poiche' i reperti colturali e microscopici possono rimanere positivi per un certo periodo di tempo, il trattamento andrebbe protratto per almeno 2 settimane dopo l'avvenuto accertamento della guarigione clinica. L'uso irregolare o la prematura sospensione del trattamento comportano il rischio di ricadute. Qualora pero' non vi siano segni di miglioramento dopo 4 settimane si dovrebbe verificare la diagnosi. **CONSERVAZIONE**Non conservare a temperatura superiore ai 25 gradi C. **AVVERTENZE**SUADIAN crema e soluzione cutanea sono indicati esclusivamente per uso esterno. Si raccomanda di evitare la loro applicazione sul contorno degli occhi. E' necessario tenere presente che la soluzione, contenendo alcool, puo' causare irritazione se applicata su ferite aperte, abrasioni, ecc. In tali casi si consiglia l'uso della crema. L'uso del prodotto, specie se prolungato, puo' dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso occorre interrompere il trattamento ed istituire una terapia adeguata. Suadian crema contiene alcool cetilico e alcool stearilico. Questi eccipienti possono causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatite da contatto). Suadian soluzione cutanea contiene propilenglicole.

Questo eccipiente puo' causare irritazione cutanea. **INTERAZIONI** Non sono stati condotti studi di interazione. Per quanto non siano riportate in letteratura interazioni medicamentose della naftifina con altri farmaci, non e' consigliabile la somministrazione contemporanea di altri farmaci per uso topico. **EFFETTI INDESIDERATI** Le seguenti frequenze sono utilizzate per la valutazione degli effetti indesiderati: molto comune ($\geq 1/10$); comune ($\geq 1/100$, $= 1/1.000$, $= 1/10.000$), **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Fertilita': non sono stati effettuati studi al fine di investigare l'effetto di Suadian sulla fertilita'. Gravidanza e allattamento: ad oggi non c'e' o e' solo molto limitata l'esperienza con l'uso di naftifina nelle donne in gravidanza. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti di tossicita' riproduttiva. A scopo precauzionale, l'applicazione di Suadian deve essere evitata durante la gravidanza e durante l'allattamento.