

TANTUM VERDE BOCCA*collutorio 120 ml 22,5 mg/15 ml + 7,5 mg/15 ml

Marchio: TANTUM VERDE
Codice Min.: 035355027
Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONETANTUM VERDE BOCCA 22,5MG/15 ML + 7,5MG/15 ML
COLLUTORIOCATEGORIA FARMACOTERAPEUTICAPreparati per il cavo faringeo, antisettici.
PRINCIPI ATTIVI100 ml contengono: benzidamina cloridrato 0,15 g (pari a benzidamina 0,134 g) e cetilpiridinio cloruro 0,05 g (pari a cetilpiridinio 0,0425g).
ECCIPIENTIGlicerolo, etanolo (96%), saccarina, olio di ricino idrogenato 40 poliossietilenato, sodio bicarbonato, aroma menta, giallo chinolina (E 104), blu patent V (E 131), acqua depurata.
INDICAZIONITrattamento antisettico, antinfiammatorio ed analgesico nelle irritazioni della bocca, delle gengive; nelle gengiviti e stomatiti. Indicato anche prima e dopo estrazioni dentarie.
CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARIipersensibilita' alla benzidamina, al cetilpiridinio o ad uno qualsiasi degli eccipienti.
POSOLOGIASciocqui con 15 ml di collutorio, 2-3 volte al giorno, utilizzando l'apposito bicchierino dosatore. Il prodotto puo' essere impiegato, all'occorrenza, in qualsiasi momento della giornata. Utilizzare per un periodo massimo di 5-7 giorni. Per un uso piu' prolungato consultare il medico.
CONSERVAZIONEConservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dall'umidita'.
AVVERTENZEL'uso, specie se prolungato di preparati per uso orofaringeo, potrebbe dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso, interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire idonea terapia.
INTERAZIONINon sono stati effettuati studi di interazione. E' tuttavia opportuno evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici.
EFFETTI INDESIDERATIIl riassunto sottostante riporta gli effetti indesiderati, per classificazione sistemica organica MedDRA. Gli effetti indesiderati sono elencati utilizzando le seguenti scale di frequenza: molto comune ($\geq 1/10$); comune ($\geq 1/100$, = 1/1000, = 1/10.000, GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Non esistono controindicazioni all'uso topico della benzidamina e cetilpiridinio in gravidanza o durante l'allattamento.