

## TANTUM VERDE P\*20 pastiglie 3 mg menta

**Marchio:** TANTUM VERDE  
**Codice Min.:** 028494033  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE TANTUM VERDE P 3 MG PASTIGLIE  
G U S T O M E N T A C A T E G O R I A  
FARMACOTERAPEUTICA Sostanze per il trattamento orale  
locale. PRINCIPI ATTIVI Ogni pastiglia contiene benzidamina  
cloridrato 3 mg (pari a 2,68 mg  
dibenzidamina). ECCIPIENTI Isomalto (E 953), aspartame (E  
951), levomentolo, acido citrico monoidrato, aroma limone,  
aroma menta, giallo chinolina (E 104), indigotina (E  
132). INDICAZIONI Adulti e nei bambini al di sopra dei 6 anni.  
Trattamento sintomatico locale del dolore e delle irritazioni della  
b o c c a e d e l l a

gola. CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI ipersensibilità accertata alla benzidamina o ad uno qualsiasi degli eccipienti. POSOLOGIA Adulti e bambini al di sopra dei 6 anni: una pastiglia 3 volte al giorno. Non superare i 7 giorni di trattamento. Bambini 6-11 anni: il prodotto deve essere assunto sotto la supervisione di una persona adulta. Bambini sotto i 6 anni: per il tipo di forma farmaceutica la somministrazione dovrebbe essere limitata a bambini al di sopra dei 6 anni. Uso orofaringeo. Sciogliere lentamente una pastiglia in bocca. Non ingoiare. Non masticare. CONSERVAZIONE Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità. Non conservare a temperatura superiore ai 25 gradi C. AVVERTENZE L'uso della benzidamina è sconsigliato in pazienti con ipersensibilità all'acido acetilsalicilico o ad altri FANS. Somministrare con cautela in soggetti che soffrono o hanno sofferto in passato di episodi di asma bronchiale, in quanto in questo tipo di pazienti potrebbero intervenire fenomeni di broncospasmo. In un numero limitato di pazienti le ulcerazioni oro-faringee possono essere segno di patologie più gravi. Pertanto, nel caso in cui i sintomi dovessero peggiorare o non migliorare entro tre giorni, o dovessero intervenire febbre o altri sintomi, il paziente deve rivolgersi al proprio medico o dentista a seconda delle necessità. Il prodotto contiene aspartame, una fonte di fenilalanina, pertanto può essere dannoso a chi è affetto da fenilchetonuria. Il prodotto contiene isomalto, i pazienti affetti da rari problemi ereditari d'intolleranza al fruttosio non devono assumere questo medicinale. INTERAZIONI Non sono stati condotti studi di interazione. EFFETTI INDESIDERATI Frequenze effetti indesiderati: molto comune ( $\geq 1/10$ ); comune ( $\geq 1/100$ , = 1/1000, = 1/10.000, GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Non vi sono dati adeguati riguardanti l'uso della benzidamina in donne in gravidanza o che allattano. Non è stata studiata l'escrezione del prodotto nel latte materno. Gli studi su animali sono insufficienti per evidenziare gli effetti sulla gravidanza o sui bambini allattati al seno. Il rischio potenziale per gli esseri umani non è noto. Il medicinale non deve essere usato né durante la gravidanza né durante l'allattamento.