

## TIROCLAR\*collirio 10 ml 4%

**Marchio:** TIROCLAR  
**Codice Min.:** 028165025  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**DENOMINAZIONE** TIROCLAR 4% COLLIRIO, SOLUZIONE **CATEGORIA** FARMACOTERAPEUTICA Farmaci oftalmologici. **PRINCIPI ATTIVI** 100 ml di collirio contengono principio attivo: 4 g di acetilcisteina. **Eccipiente** con effetti noti: questo medicinale contiene 1.42 mcg di benzalconio cloruro per goccia equivalente a 0,05 mg/ml. Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. **ECCIPIENTI** Alcool polivinilico, sodio edetato, sodio cloruro, potassio cloruro, benzalconio cloruro, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili. **INDICAZIONI** TIROCLAR e' indicato nel trattamento dei disturbi oftalmici dovuti a deficit lacrimale con e senza alterazione della componente mucosa quali: cheratoconjuntivite secca, affezioni corneali da alterata secrezione lacrimale, cheratopatie a diversa eziologia, ulcere

corneali. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. **POSOLOGIA** Posologia: instillare 1-2 gocce nel sacco congiuntivale 3-4 volte al giorno, secondo prescrizione medica. **CONSERVAZIONE** Tiroclar non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. Dopo apertura della confezione, il collirio puo' essere utilizzato per un periodo di tempo non superiore a tre settimane. Si raccomanda di richiudere immediatamente il flacone dopo ogni singola applicazione. **AVVERTENZE** Sia dagli studi preclinici che da quelli clinici non emergono evidenze circa la necessita' di particolari precauzioni all'impiego del farmaco. E' bene comunque non impiegare lenti a contatto morbide in corso di terapia, perche' possono accumulare il conservante contenuto nella preparazione. Tiroclar contiene benzalconio cloruro: benzalconio cloruro puo' essere assorbito dalle lenti a contatto morbide e puo' portare al cambiamento del loro colore. Le lenti a contatto devono essere rimosse prima di usare questo medicinale e possono essere riapplicate 15 minuti dopo la somministrazione. Sono stati riportati casi di irritazione agli occhi, occhio secco, alterazione del film e della superficie corneali a seguito di somministrazione oftalmica di benzalconio cloruro. Da usare con cautela nei pazienti con occhio secco e con compromissione della cornea. Generalmente gli occhi dei bambini reagiscono in maniera piu' marcata rispetto agli occhi degli adulti. L'irritazione nei bambini puo' quindi interferire con l'aderenza alla terapia. I pazienti devono essere monitorati in caso di uso prolungato. **INTERAZIONI** Non si conoscono a tutt'oggi interazioni nel caso di applicazione locale oculare. **EFFETTI INDESIDERATI** Possibili fenomeni irritativi di norma transitori e, su soggetti ipersensibili, fenomeni di sensibilizzazione che richiedono l'interruzione del trattamento. **Segnalazione delle reazioni avverse sospette.** La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale e' importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo

<https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Non sono disponibili evidenze che sconsigliano l'impiego del TIROCLAR durante la gravidanza e l'allattamento.