

TOCALFA*20 cps molli 50.000 UI+ 50 mg

Marchio: Costanzafarma
Codice Min.: 005982020
Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONE TOCALFA **CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA** Preparati vitaminici, associazioni. **PRINCIPI ATTIVI** 1 capsula molle da 0,271 g ca contiene: retinolo esteri soluz. conc. 50.000 U.I.; d,l alfa - Tocoferil acetato. 50 mg. **ECCIPIENTI** Olio per preparazioni iniettabili, gelatina, glicerolo, etile p-idrossibenzoato sodico, propile p-idrossibenzoato sodico. **INDICAZIONI** Condizioni associate a stati carenziali di Vitamina A ed E. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' nota verso i componenti. **POSOLOGIA** 1 - 2 capsule molli al giorno. Per cicli di 30-90 giorni intervallati da opportuni periodi di sospensione. Il ciclo terapeutico puo' esser ripetuto durante l'anno in caso di necessita'. Nelle terapie molto prolungate, specie se per diversi anni, non eccedere nel numero e nella durata dei cicli terapeutici consigliati per ogni anno, allo scopo di non incorrere nel rischio di iperdosaggio cronico da vitamina A. **CONSERVAZIONE** Nessuna speciale precauzione per la conservazione. **AVVERTENZE** Dosi molto elevate di Vitamina A negli animali sono teratogene e sono state associate in casi isolati a malformazioni nell'uomo. Al fine di evitare la comparsa di segni e sintomi di iperdosaggio impiegare il prodotto sotto controllo medico e per il periodo di tempo ritenuto strettamente necessario. Le preparazioni contenenti vitamina E debbono essere usate con attenzione nei diabetici e nei soggetti con insufficienza cardiaca poiche' questa vitamina puo' ridurre il fabbisogno di insulina e di digitale. **INTERAZIONI** La vitamina E puo' potenziare l'azione della digitale o dell'insulina. **EFFETTI INDESIDERATI** Il prodotto utilizzato alle dosi consigliate e' in genere ben tollerato; solo in caso di somministrazione continua e ad alte dosi possono comparire segni e sintomi di ipervitaminosi A (anoressia, epatosplenomegalia, turbe cutanee, ecc.). **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Quantitativi giornalieri di vitamina A piu' elevati di 10.000 U.I. vanno evitati in gravidanza (specie nei primi mesi) e si deve consultare il medico per i consigli circa la quantita' totale di vitamina A assumibile attraverso le diverse fonti. Il prodotto, contenendo vitamina A ad alte dosi, non deve pertanto, essere utilizzato in corso di gravidanza.