

TRACTANA*28 cpr riv 200 mg

Marchio: -
Codice Min.: 047839016
Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONE TRACTANA COMPRESSE RIVESTITE **CATEGORIA** FARMACOTERAPEUTICA Ipnotici e sedativi. **PRINCIPI ATTIVI** Ogni compressa rivestita contiene 200 mg di estratto secco di Passiflora incarnata L., herba (equivalenti a 700 mg - 1000 mg di passiflora). Solvente di estrazione: etanolo 60% V/V. Eccipiente con effetto noto: ogni compressa contiene meno di 1mmol (23mg) di sodio, cioè essenzialmente 'senza sodio'. Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. **ECCIPIENTI** Nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, povidone, sodio amido glicolato (tipo A), olio di cotone idrogenato, silice colloidale anidra, fosfato tricalcico. Rivestimento: alcol polivinilico, diossidi di titanio (E171), macrogol, talco, ossido di ferro rosso (E172). Eccipiente nell'estratto: maltodestrina. **INDICAZIONI** Medicinale di origine vegetale d'uso tradizionale indicato per alleviare i sintomi lievi di stress mentale, come ad esempio il nervosismo, l'ansia o l'irritabilità e per favorire il sonno. Il prodotto è un medicinale di origine vegetale d'uso tradizionale da utilizzare per indicazioni specifiche basate esclusivamente sull'impiego di lunga data. Tractana è indicato negli adulti e nei bambini di età superiore a 12 anni. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. **POSOLOGIA** Posologia. Adulti e bambini di età superiore a 12 anni: per il sollievo dello stress mentale transitorio: 1-2 compresse mattino e sera. Il dosaggio può essere aumentato in base alle indicazioni del medico o del farmacista (fino ad un massimo di 8 compresse al giorno). Per favorire il sonno: 1-2 compresse la sera mezz'ora prima di andare a dormire. Popolazione pediatrica: in assenza di dati sufficienti, non è consigliato l'uso nei bambini di età inferiore a 12 anni. Durata di utilizzo: se i sintomi persistono per più di 2 settimane durante l'uso del medicinale, consultare un medico o un professionista sanitario qualificato. Modo di somministrazione: uso orale. Assumere le compresse con abbondante quantità d'acqua. **CONSERVAZIONE** Questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità. **AVVERTENZE** L'uso nei bambini di età inferiore a 12 anni non è stato convalidato a causa dell'assenza di dati adeguati. Se i sintomi peggiorano durante l'uso del medicinale, consultare un medico o un professionista sanitario qualificato. Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23mg) di sodio per compressa, cioè essenzialmente 'senza sodio'. **INTERAZIONI** Non è raccomandato l'uso contemporaneo di sedativi di origine sintetica (come le benzodiazepine) tranne se consigliato da un medico o da un farmacista. Per evitare interazioni tra farmaci, i pazienti devono informare il proprio medico o farmacista di altri eventuali trattamenti in corso durante l'assunzione di Tractana. **EFFETTI INDESIDERATI** Nessuno noto. In caso di reazioni avverse, consultare un medico o un professionista sanitario qualificato. Segnalazione delle reazioni avverse sospette. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori

sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Gravidanza e allattamento: non e' stata stabilita l'assenza di rischio durante la gravidanza o l'allattamento. Uno studio in una specie animale ha mostrato tossicita' riproduttiva (vedere sezione 5.3). In assenza di dati sufficienti, non e' consigliato l'uso durante la gravidanza o l'allattamento. Fertilita': non sono disponibili dati sulla fertilita'.