

## VAGISIL\*crema derm 20 g 2%

**Marchio:** VAGISIL  
**Codice Min.:** 028700033  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**DENOMINAZIONE**VAGISIL 2% **CREMA****CATEGORIA**  
**FARMACOTERAPEUTICA**Antipruriginosi, inclusi antiistaminici,  
anestetici, ecc.**PRINCIPI ATTIVI**100 g di crema: lidocaina base  
2,0 g.**ECCIPIENTI**Acqua depurata, acido stearico, glicerina,  
glicerina monostearato, olio di ricino solfonato, trietanolamina,  
diethylenglicolemonoetiletere, alcool isopropilico, profumo di rosa,  
c l o r o t i m o l o , z i n c o o s s i d o ,  
sodiodiottilsolfosuccinato.**INDICAZIONI**Prurito vulvare e  
perianale.**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilit  
a' alla lidocaina, o agli altri componenti del prodottoe sostanze  
strettamente correlate da un punto di vista chimico. Eta'

pediatrica. Gravidanza ed allattamento.**POSOLOGIA**L'uso del prodotto e' destinato a pazienti adulti.  
Applicare in stratosottile sull'area da trattare: l'applicazione puo' essere ripetuta fino a 3 o 4 volte al  
giorno, se necessario. Usare solo per brevi periodi di trattamento**CONSERVAZIONE**Nessuna speciale  
precauzione.**AVVERTENZE**Le eventuali reazioni e complicazioni sono piu' facilmente evitabili  
utilizzando i minimi dosaggi efficaci. Porre attenzione negli anziani enei pazienti gravemente ammalati.  
Non usare in caso di lesione dellemuose condizione in cui e' necessario consultare il medico. L'uso  
specie se prolungato, dei prodotti per uso topico, puo' dare luogo a fenomeni di sensibilizzazione, in tal  
caso e' necessario interrompere il trattamento e, se necessario, istituire terapia idonea. Dopo un breve  
periodo di trattamento, senza risultati, apprezzabili o in caso di sospetta infezione micotica, consultare il  
medico.**INTERAZIONI**Il propanolo prolunga l'emivita plasmatica della lidocaina. La cimetidina puo'  
innalzare i livelli plasmatici di lidocaina.**EFFETTI INDESIDERATI**Esclusivamente l'uso estremamente  
improprio del prodotto puo' dare effetti sistemici indesiderati. E' possibile la comparsa, sia pure in casi  
rari, di reazioni allergiche. Pazienti allergici agli anestetici derivati dall'acido paraminobenzoico  
(procaina, tetracaina, benzocaina, ecc.) presentano reattivita' crociata nei confronti della  
lidocaina.**GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO**Studi preclinici condotti sul ratto e sul coniglio, non hanno  
messo inevidenza rischi per il feto. Tuttavia, poiche' non sono disponibili dati clinici nella donna gravida,  
l'uso del prodotto e' da considerarecontroindicato in tale situazione.