

VALERIANA DISPERT*20 cpr riv 125 mg

Marchio: VALERIANA DISPERT
Codice Min.: 004853053
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE VALERIANA DISPERT 125 MG
COMPRESSE RIVESTITE CATEGORIA
FARMACOTERAPEUTICA Ipnotici e sedativi.
PRINCIPI ATTIVI Estratto secco di radice di valeriana preparato con etanolo 70 % v/v.
ECCIPIENTI Destrina, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, macrogol 4000, silice colloidale anidra, magnesio stearato, lacca, ipromellosa, talco, magnesio ossido leggero, gomma arabica, saccarosio, povidone K25, macrogol 6000, titanio diossido, carmellosa sodica, cera bianca, cera carnauba.
INDICAZIONI Medicinale a base di piante per il trattamento di stati di lieve e temporanea tensione nervosa e

della temporanea difficoltà nel prendere sonno.
CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati; l'uso nei bambini al di sotto dei 12 anni è sconsigliato, poiché non sono disponibili dati sull'efficacia e sicurezza del farmaco in pediatria; generalmente controindicato in gravidanza e durante l'allattamento.
POSOLOGIA >> Adulti e bambini sopra i 12 anni. Dose singola: 4 compresse rivestite. Per la tensione nervosa: fino a 3 volte al giorno. Come aiuto per prendere sonno, una dose singola da mezz'ora a un'ora prima di coricarsi e, se necessario una dose in precedenza durante la serata. Anziani: come per gli adulti. Modo di somministrazione: uso orale. Le compresse devono essere inghiottite senza masticare.
CONSERVAZIONE Non conservare a temperatura superiore ai 30 gradi C.
AVVERTENZE Il prodotto contiene lattosio e saccarosio.
INTERAZIONI Non sono state segnalate interazioni. Il paziente è comunque invitato a chiedere consiglio al medico se sta assumendo altri farmaci.
EFFETTI INDESIDERATI Non sono noti effetti indesiderati da attribuire all'uso del medicinale alle condizioni raccomandate e per brevi periodi di tempo. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale.
GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Poiché non sono disponibili dati sull'uso durante la gravidanza e l'allattamento, in via precauzionale, ne è generalmente sconsigliato l'uso. Non sono stati segnalati effetti avversi in seguito all'uso comune di radice di valeriana come medicinale, ma al riguardo mancano adeguati dati sperimentali.