

VALONTAN*10 cpr riv 100 mg

Marchio: VALONTAN
Codice Min.: 003452024
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE VALONTAN ADULTI 100 MG COMPRESSE RIVESTITE **CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA** Antiemetici ed antinausea. **PRINCIPI ATTIVI** Ogni compressa rivestita contiene: principio attivo dimenidrinato 100mg. Eccipiente con effetti noti: ogni compressa rivestita contiene 16mg di saccarosio. Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. **ECCIPIENTI** Saccarosio, silice colloidale, magnesio stearato, amido di mais. Componenti del rivestimento: resina acrilica (Eudragit), talco. **INDICAZIONI** Prevenzione e trattamento della nausea, del vomito e della vertigine, propri delle naupatie (mal di mare, d'auto, di treno, d'aereo).

CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARIipersensibilita' al principio attivo, verso altri antistaminici, o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Controindicato nei bambini e adolescenti. Controindicato durante la gravidanza e l'allattamento. **POSOLOGIA** Adulti: nelle naupatie (mal di mare, d'auto, di treno, d'aereo), la nausea e il vomito possono essere controllati con una dose singola di mezza compressa di VALONTAN adulti (50 mg), il cui effetto dura approssimativamente per 4 ore; questa dose, occorrendo, può essere ripetuta, a scopo di prevenzione, ogni 4 ore (3 compresse nelle 24 ore). Non superare le dosi consigliate. Non usare per trattamenti prolungati. **CONSERVAZIONE** Nessuna. **AVVERTENZE** L'uso degli antistaminici contemporaneamente a certi antibiotici o altri farmaci ototossici può mascherare i primi segni di ototossicità, la quale può rivelarsi solo quando il danno è irreversibile. Usare con cautela in soggetti affetti da glaucoma, ipertrofia prostatica, altre sindromi di ritenzione urinaria, ostruzione intestinale, ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari, asma bronchiale, bronchite cronica o enfisema, ipertiroidismo. Il medicinale può esacerbare disordini convulsivi. Va pertanto impiegato con molta cautela nei soggetti affetti da epilessia. VALONTAN adulti contiene saccarosio. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio, da malassorbimento di glucosio-galattosio, o da insufficienza di sucralasi isomaltasi, non devono assumere questo medicinale. **INTERAZIONI** Durante il trattamento evitare l'uso contemporaneo di bevande alcoliche e di farmaci antidepressivi, ipnotici, sedativi o tranquillanti, allo scopo di impedire eventuali fenomeni additivi di sedazione (vedere anche paragrafo 4.7). **EFFETTI INDESIDERATI** In seguito al trattamento con VALONTAN adulti sono stati segnalati i seguenti effetti indesiderati. Disturbi del metabolismo e della nutrizione. Effetti indesiderati frequenti: anoressia. Disturbi psichiatrici. Effetti indesiderati meno frequenti: insonnia, euforia. Patologie del sistema nervoso. Effetti indesiderati più frequenti: sedazione, sonnolenza; effetti indesiderati frequenti: cefalea; effetti indesiderati meno frequenti: vertigine, tremori, convulsioni. Patologie dell'occhio. Effetti indesiderati frequenti: disturbi dell'accomodazione. Patologie cardiache. Effetti

indesiderati meno frequenti: tachicardia. Patologie vascolari. Effetti indesiderati meno frequenti: ipotensione. Patologie gastrointestinali. Effetti indesiderati frequenti: secchezza delle fauci, nausea. Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo. Effetti indesiderati frequenti: fotosensibilità, reazione cutanea su base allergica. Patologie renali e urinarie. Effetti indesiderati frequenti: disturbi della minzione. Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione. Effetti indesiderati meno frequenti: astenia. Segnalazione delle reazioni avverse sospette. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO VALONTAN adulti e' controindicato durante la gravidanza e l'allattamento (vedere paragrafo 4.3). Nelle pazienti che allattano occorre decidere se rinunciare a nutrire al seno il bambino ed iniziare il trattamento o, viceversa, proseguire l'allattamento evitando la somministrazione del prodotto.