

VEROLAX*BB 6 contenitori monodose 2,25 g soluz rett

Marchio: VEROLAX
Codice Min.: 026525042
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE VEROLAX CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA Farmaci per la costipazione. **PRINCIPI ATTIVI** Adulti Soluzione Rettale. 6 contenitori monodose 9 G: glicerina 6,75 g. Bambini Soluzione Rettale. 6 Contenitori Monodose 3 G: glicerina 2,25 g. Adulti Supposte: glicerina 2,25 g. Bambini Supposte: glicerina 1,375 g. Lattanti Supposte: glicerina 0,675 g. **ECCIPIENTI** Soluzione rettale. Adulti e Bambini: malva estratto fluido; camomilla estratto fluido; amido di frumento; acqua depurata. Supposte Adulti, Bambini, Lattanti: sodio stearato, sodio carbonato. **INDICAZIONI** Stitichezza. **CONTROINDICAZIONI/EFF.**

SECONDARIipersensibilita' individuale accertata verso il prodotto. Afezioni ano-rettali, rettocolite emorragica e infiammazione delle emorroidi. **POSOLOGIA** Soluzione rettale: 1 o 2 contenitori monodose nelle 24 ore. In caso distipsi ostinata si possono introdurre nel retto non piu' di 2 dosi contemporaneamente. Supposte: 1 supposta al bisogno. Non superare le dosi consigliate. **CONSERVAZIONE** Nessuna speciale precauzione per la conservazione. **AVVERTENZE** L'uso continuo dei lassativi puo' provocare assuefazione o danno di diverso tipo. Non usare lassativi se sono presenti dolori addominali, nausea e vomito. Se la costipazione e' ostinata consultare il medico. **INTERAZIONI** Non sono state riscontrate interazioni con altri farmaci. **EFFETTI INDESIDERATI** Gli unici effetti che possono riscontrarsi sono di tipo irritativo, alivello dell' area rettale. Si tratta solitamente di forme lievi, chenon richiedono l' intervento del medico. **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Sulla base delle sue proprieta' chimico-fisiche, la glicerina per viarettale puo' essere utilmente impiegata durante la gravidanza o il puerperio.