

VISUGLICAN*collirio 25 monod 40 mg/ml + 2 mg/ml

Marchio: VISUGLICAN
Codice Min.: 024851026
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE VISUGLICAN 40MG/ML + 2MG/ML COLLIRIO, SOLUZIONE CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA Decongestionanti ed antiallergici. PRINCIPI ATTIVI 100 ml di collirio, soluzione contengono: sodio cromoglicato 4 g; clorfenamina maleato 0,2 g. ECCIPIENTI Questo medicinale collirio, soluzione in flacone da 10 ml: 100 ml di collirio contengono: sodio edetato; fosfato bisodico; fosfato monosodico; acqua depurata. Questo medicinale collirio, soluzione in contenitori monodose: 100 ml di collirio contengono: sodio edetato; fosfato bisodico; fosfato monosodico; acqua per preparazioni

iniezzabili. INDICAZIONI Trattamento delle congiuntiviti di natura tossica, allergiche e primaverili, ad andamento subacuto e cronico. CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI persensibilita' ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti. POSOLOGIA 1-2 gocce nel fornice congiuntivale quattro volte al giorno. Prima dell'uso assicurarsi che il contenitore monodose sia intatto. Questo farmaco in contenitore monodose va usato solo immediatamente dopo l'apertura. L'eventuale residuo non deve essere utilizzato. Evitare che l'estremita' del contenitore venga a contatto con l'occhio o con qualsiasi altra superficie. CONSERVAZIONE Flacone: conservare a temperatura non superiore ai 25 gradi C. Monodose: tenere il prodotto lontano da fonti di calore. AVVERTENZE Da usare sotto il diretto controllo del medico. Non utilizzare se la soluzione non e' limpida. Questo medicinale in flacone da 10 ml contiene fosfato bisodico 6,50 mg per 1 ml equivalente a 65 mg/10 ml, e fosfato monosodico 2 mg per 1 ml equivalente a 20 mg/10 ml. Questo farmaco monodose contiene fosfato bisodico 8,12 mg per 1 ml equivalente a 4,06mg/0,5 ml e fosfato monosodico 4,5 mg per 1 ml equivalente a 2,25 mg/0,5 ml. INTERAZIONI Non sono note interazioni con altri farmaci. Tuttavia sono possibili effetti additivi quando questo medicinale e' somministrato contemporaneamente a H2 antagonisti (cimetidina) e con corticosteroidi. EFFETTI INDESIDERATI Raramente sono stati riportati fenomeni irritativi e bruciore. In questi casi e' consigliabile sospendere il trattamento. Molto raramente sono stati riportati casi di calcificazione della cornea associati all'uso di colliri contenenti fosfati in pazienti con cornea significativamente danneggiata. Segnalazione delle reazioni avverse sospette. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale e' importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: <https://www.aifa.gov.it/web/guest/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Come per ogni farmaco e' opportuno, quando possibile, evitare la somministrazione

durante il primo trimestre di gravidanza. Se l'uso di questo prodotto e' ritenuto essenziale in una madre che allatta, la paziente deve sospendere l'allattamento.