

## VISUSTRIN\*collirio 10 ml 1 mg/ml

**Marchio:** VISUSTRIN  
**Codice Min.:** 015582012  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**DENOMINAZIONE**VISUTRIN 1 MG/ML COLLIRIO SOLUZIONE**CATEGORIA**  
**FARMACOTERAPEUTICA**Simpaticomimetici impiegati come  
decongestionanti.**PRINCIPI ATTIVI**10 ml di collirio contengono tetrizolina  
cloridrato 10 mg.**ECCIPIENTI**Acido bórico; sodio cloruro; borace; benzalconio  
cloruro; sodio edetato; acqua depurata.**INDICAZIONI**Ipertemie, pruriti, bruciori,  
edema congiuntivale.**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al  
principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Il medicinale non deve essere  
usato da soggetti con glaucoma o con altre gravi malattie dell' occhio e nei  
bambini sotto i tre anni.**POSOLOGIA**Applicare 2 gocce in ogni occhio due o tre  
volte al giorno. Non superare le dosi consigliate.**CONSERVAZIONE**Da  
conservarsi a temperatura non superiore a 25 gradi C.**AVVERTENZE**In caso di

persistenza o aggravamento dei sintomi dopo breve periodo di trattamento, consultare il medico; in ogni caso, il prodotto non deve essere impiegato per piu' di quattro giorni consecutivi, stante la possibilita' che possano verificarsi, in caso contrario, effetti indesiderati. Infezioni, pus, corpi estranei nell' occhio, danni meccanici, chimici, da calore, richiedono l'attenzione del medico. Il prodotto, pur presentando uno scarso assorbimento sistemico, deve essere usato con cautela nei pazienti affetti da ipertensione, ipertiroidismo, disturbi cardiaci e iperglicemia (diabete) e nei soggetti in corso di trattamento con farmaci antidepressivi. Per chi svolge attivita' sportiva: l'uso del farmaco senza necessita' costituisce doping e puo' determinare comunque positività ai test anti-doping. Puo' causare irritazione agli occhi. Evitare il contatto con lenti a contatto morbide. Togliere le lenti a contatto prima dell'applicazione e attendere almeno 15 minuti prima di riapplicarle. E' nota l'azione decolorante nei confronti delle lenti a contatto morbide. Attenersi con scrupolo alle dosi consigliate. Il prodotto se accidentalmente ingerito o se impiegato per un lungo periodo a dosi eccessive puo' determinare fenomeni tossici. Non ottenendo sollievo entro le 48 ore dall' inizio del trattamento, sospendere l'uso ed effettuare un accurato esame oftalmologico. L'ingestione accidentale da parte dei bambini puo' provocare sedazione spiccata. La sicurezza e l'efficacia nei bambini non sono state accertate. L'uso nei bambini al di sopra dei tre anni di eta' deve essere valutata dal medico.**INTERAZIONI**Non note.**EFFETTI INDESIDERATI**L'uso puo' determinare talvolta dilatazione pupillare, effetti sistemici di assorbimento (ipertensione, disturbi cardiaci, iperglicemia), aumento della pressione endoculare, nausea, cefalea. Segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione.**GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO**Nelle donne in stato di gravidanza o durante l'allattamento il medicinale va somministrato nei casi di effettiva necessita', sotto il diretto controllo del medico.