

YOVIS*orale grat 10 bust 1 g

Marchio: YOVIS
Codice Min.: 029305012
Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONE YOVIS **CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA** Microrganismi antidiarroici. **PRINCIPI ATTIVI** Fermenti lattici vivi liofilizzati. **ECCIPIENTI** Granulato per sospensione orale: lattosio, crioprotettivi (latte scremato in polvere, lattosio, saccarosio, estratto di lievito, acqua, sodio malato, sodio glutammato, tween 80, acido ascorbico, silice). Granulato per sospensione orale da 250 mg: silice colloidale, magnesio stearato, amido di mais, crioprotettivi (latte scremato in polvere, lattosio, saccarosio, estratto di lievito, acqua, sodio malato, sodio glutammato, tween 80, acido ascorbico, silice). Capsule rigide da 250 mg: silice colloidale, magnesio stearato, amido di mais, gelatina, titanio biossido, indigo carmine, giallo chinolina, crioprotettivi (latte scremato in polvere, lattosio, saccarosio, estratto di lievito, acqua, sodio malato, sodio glutammato, tween 80, acido ascorbico, silice). **INDICAZIONI** Sindromi dismicrobiche intestinali: sindromi diarroiche e dispeptiche da alterata flora batterica (diarrea, enteriti a specifiche, coliti); dismicrobismo intestinale da antibiotici. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI** Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti; pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, da deficit di Lapp lattasi, o da malassorbimento di glucosio-galattosio. **POSOLOGIA** Granulato per sospensione orale da 1 g. Adulti: 1-3 bustine al giorno. Granulato per sospensione orale da 250 mg. Adulti: 4 bustine 1-3 volte al giorno, preferibilmente prima dei pasti. Capsule rigide da 250 mg. Adulti: 4 capsule 1-3 volte al giorno. Granulato per sospensione orale da 1 g. Bambini 6-12 anni: 1 bustina al giorno. Granulato per sospensione orale da 250 mg. Bambini 0-6 mesi: 1 bustina al giorno; 6-12 mesi: 1-2 bustine al giorno; 1-3 anni: 2 bustine al giorno; 3-6 anni: 2-3 bustine al giorno; 6-12 anni: 4 bustine al giorno. Capsule rigide da 250 mg. Bambini: 0-6 mesi: 1 capsula al giorno; 6-12 mesi: 1-2 capsule al giorno; 1-3 anni: 2 capsule al giorno 3-6 anni: 2-3 capsule al giorno 6-12 anni: 4 capsule al giorno. **Metodo di somministrazione:** il contenuto delle buste può essere disciolto in acqua o latte o altra bevanda non calda. Le capsule sono apribili; il contenuto della capsula può essere disciolto in acqua o latte o altra bevanda non calda. La durata media del trattamento è di 1-2 settimane. **CONSERVAZIONE** Conservare in frigorifero (2 gradi C - 8 gradi C). **AVVERTENZE** Capsule rigide e granulato per sospensione orale contengono anche saccarosio. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio, da malassorbimento di glucosio-galattosio o da insufficienza di sucrasi isomaltasi, non devono assumere questo medicinale. Granulato per sospensione orale contiene 2 g di lattosio (1 g di glucosio e 1 g di galattosio) per dose; il dosaggio giornaliero consigliato (1-3 bustine) fornisce quindi 2-6 g di lattosio. Da tenere in considerazione in persone affette da diabete mellito. Non sono disponibili dati sull'uso in pazienti con insufficienza epatica. Non sono disponibili dati sull'uso in pazienti con insufficienza renale. Poiché rari casi di complicanze infettive si sono verificati con l'uso di probiotici in pazienti a rischio di pancreatite acuta severa, si raccomanda cautela in questa popolazione. **INTERAZIONI** Non segnalate. **EFFETTI INDESIDERATI** Le reazioni avverse sono state identificate dagli studi clinici, letteratura e post-

marketing. Le informazioni sono riportate secondo MedDRA system organ classification (SOC). Gli eventi avversi sono classificati secondo la frequenza: Molto comune ($\geq 1/10$), comune ($\geq 1/100$, $= 1/1.000$, $= 1/10.000$), GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Il prodotto farmaceutico puo' essere usato durante la gravidanza e durante l'allattamento. Non sono stati condotti studi sulla fertilita'.