

ZERINOL GOLA MENTA*18 pastiglie 20 mg

Marchio: ZERINOL
Codice Min.: 036088122
Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONE ZERINOL GOLA MENTA 20 MG PASTIGLIE **CATEGORIA** FARMACOTERAPEUTICA Preparati per il cavo faringeo (anestetici locali). **PRINCIPI ATTIVI** Una pastiglia contiene 20 mg di ambroxolo cloridrato. **Eccipiente(i)** con effetti noti: una pastiglia contiene sorbitolo (E420) (1,37 g a pastiglia) e lattosio monoidrato (meno di 1 mg a pastiglia). Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. **ECCIPIENTI** Aroma menta (gomma arabica, olio di menta cinese, maltodestrine, lattosio-monoidrato) Sorbitolo (E420) Saccarina sodica Macrogol 6000 Talco **INDICAZIONI** Trattamento sintomatico del dolore acuto nel mal di gola. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. **POSOLOGIA** Posologia. Adulti e bambini sopra i 12 anni: fino a 6 pastiglie al giorno, da sciogliere in bocca. Zerinol Gola menta 20 mg pastiglie non deve essere usato per piu' di 3 giorni. Nel caso persistano sintomi o febbre alta, il paziente deve consultare un medico. Popolazione pediatrica: Zerinol Gola menta 20 mg pastiglie non deve essere usato nei bambini di eta' inferiore a 12 anni. **Modo di somministrazione:** per mucosa orale. Zerinol Gola menta 20 mg pastiglie e' adatto per i diabetici. **CONSERVAZIONE** Non conservare a temperatura superiore a 30. **C.AVVERTENZE** Sono stati segnalati casi di reazioni cutanee gravi quali eritema multiforme, sindrome di Stevens-Johnson (SJS)/necrolisi epidermica tossica (TEN) e pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP) associati alla somministrazione di ambroxolo cloridrato. Se sono presenti sintomo segni di rash cutaneo progressivo (talvolta associato a vesciche o lesioni della mucosa), il trattamento con ambroxolo cloridrato deve essere interrotto immediatamente e deve essere consultato un medico. Episodi di dispnea si possono verificare in un contesto di malattia latente (come per esempio la gola gonfia). Anche reazioni allergiche locali (vedere paragrafo 4.8: angioedema) possono anche essere causa di dispnea. Le proprieta' anestetiche locali di ambroxolo possono alterare la percezione sensoriale a livello dello spazio faringeo (vedere paragrafo 4.8: ipoestesia del cavo orale e della faringe). Zerinol Gola menta 20 mg pastiglie non e' adatto per il trattamento delle ulcere del cavo orale. In questi casi rivolgersi al medico. In caso di funzionalita' renale compromessa o di grave epatopatia, Zerinol Gola menta 20 mg pastiglie puo' essere utilizzato solo dopo aver consultato il medico. Come per ogni medicinale con metabolismo epatico seguito da eliminazione renale, in caso di insufficienza renale grave, puo' verificarsi l'accumulo di metaboliti di ambroxolo nel fegato. Questo medicinale contiene 8,2 g di sorbitolo per dose massima giornaliera raccomandata (1,37 g per pastiglia). I pazienti con rara condizione ereditaria di intolleranza al fruttosio non devono assumere questo medicinale. Una pastiglia di Zerinol Gola menta 20 mg pastiglie contiene meno di 1 mg di lattosio. Tale dose non provoca normalmente disturbi in soggetti intolleranti al lattosio. Tuttavia i pazienti con rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, deficienza di lattasi o con problemi di malassorbimento di glucosio/galattosio, devono usare Zerinol Gola menta 20 mg pastiglie con cautela. **Popolazione pediatrica** Zerinol Gola

menta 20mg pastiglie non deve essere usato in bambini di eta' inferiore a 12 anni. **INTERAZIONI** Non e' stata osservata alcuna interazione sfavorevole clinicamente rilevante con altri farmaci. **EFFETTI INDESIDERATI** Frequenza stimata sulla base dei dati clinici disponibili: molto comune ($\geq 1/10$) comune ($\geq 1/100$ e $= 1/1.000$ e $= 1/10.000$ e **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Gravidanza: Ambroxolo cloridrato attraversa la barriera placentare. Studi non clinici non hanno dimostrato alcun effetto nocivo diretto o indiretto sulla gravidanza, sullo sviluppo embrionale/fetale, sul parto sulla crescita postnatale. Una vasta esperienza clinica dopo la ventottesima settimana di gravidanza, non ha evidenziato la comparsa di effetti dannosi sul feto. Nonostante cio', devono essere adottate le normali precauzioni sull'assunzione di medicinali in gravidanza. Specialmente durante il primo trimestre, l'uso di Zerinol Gola menta 20 mg pastiglie non e' consigliato. Allattamento: Ambroxolo cloridrato viene escreto nel latte materno. Anche se non sono attesi effetti indesiderati sui lattanti, l'uso di Zerinol Gola menta 20 mg pastiglie non e' consigliato durante l'allattamento. Fertilita': studi non clinici non indicano effetti nocivi diretti o indiretti riguardanti la fertilita'.