

ZEROFLOG*collutorio 200 ml 0,074 g/100 ml

Marchio: Valeas
Codice Min.: 034373011
Link: [clicca qui per acquistare](#)



D E N O M I N A Z I O N E Z E R O F L O G C A T E G O R I A
FARMACOTERAPEUTICA stomatologici **PRINCIPI ATTIVI** ZEROFLOG 0,074 g /100 ml collutorio, 1 flacone 100 ml di collutorio contengono, principio attivo: Diclofenac acido (acido 2-[(2,6-diclorofenil)amino] benzenacetico) g 0,074. **Eccipiente(i)** con effetti noti: sodio benzoato. ZEROFLOG 0,011 g/15 ml collutorio, 12 bustine. Ogni bustina da 15 ml contiene, principio attivo: Diclofenac acido (acido 2-[(2,6-diclorofenil)amino] benzenacetico) g 0,011. **Eccipiente(i)** con effetti noti: sodio benzoato. ZEROFLOG 0,022g /15 ml soluzione, spray per mucosa orale 15 ml di soluzione contengono, principio attivo: Diclofenac acido (acido 2-[(2,6-diclorofenil)amino] benzenacetico) g 0,022. **Eccipiente(i)** con effetti noti: sodio benzoato, etanolo. Per l'elenco completo degli eccipienti vedere

sezione 6.1 **ECCIPIENTI** ZEROFLOG, Collutorio: (flacone e bustine) sorbitolo liquido non cristallizzabile, colina (base), sodio benzoato, disodio edetato, acesulfame potassico, menta aroma naturale, pesca aroma naturale, colorante rosso ponceau (E124), acqua depurata. ZEROFLOG soluzione spray per mucosa orale: sorbitolo liquido non cristallizzabile, colina cloruro, disodio edetato, sodio benzoato, acesulfame potassico, olio essenziale di menta, pesca aroma naturale, colorante rosso ponceau (E 124), etanolo 96%, sodio idrossido, acqua depurata. **INDICAZIONI** Trattamento sintomatico di stati irritativo-infiammatori anche associati a dolore del cavo orofaringeo (ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti), anche in conseguenza di terapia dentaria conservativa o estrattiva. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo, o sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico all'acido acetilsalicilico o ad altri farmaci antiinfiammatori non steroidei o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1 **POSOLOGIA** Posologia. Collutorio: la dose raccomandata e' di 2-3 sciacqui o gargarismi al giorno con 15 ml (1 misurino o 1 bustina) di collutorio puroo diluito in poca acqua. Spray per mucosa orale: la dose raccomandata e' di 2 spruzzi tre volte al giorno indirizzati direttamente sulla parte interessata. Ogni spruzzo eroga 0,2 ml di soluzione equivalenti a 0,3 mg di principio attivo. **CONSERVAZIONE** Collutorio (flacone e bustine): conservare a temperatura inferiore a 25 gradi C. Soluzione spray per mucosa orale. Conservare a temperatura inferiore a 25 gradi C. **AVVERTENZE** L'eventuale deglutizione involontaria della dose di collutorio impiegata per sciacqui e gargarismi non comporta alcun danno per il paziente in quanto equivale a un quinto/sesto della dose prevista da posologia per via sistemica. L'uso, specie se prolungato dei preparati topici puo' dare luogo a fenomeni di sensibilizzazione, nel qual caso occorre interrompere la cura e istituire, se necessario, terapia idonea. Sebbene l'assorbimento sistemico sia limitato, Zeroflog deve essere somministrato con cautela nei pazienti con una storia di emorragia gastrointestinale o perforazione relativa a precedenti trattamenti attivi o storia di emorragia/ulcera

peptica ricorrente (due o piu' episodi distinti dimostrata ulcerazione o sanguinamento).**INTERAZIONI**Poiche' l'assorbimento sistemico e' limitato nelle normali condizioni di utilizzo, interazioni con altri medicinali sono improbabili.**EFFETTI INDESIDERATI**Gli effetti indesiderati elencati per frequenza sono riportati, usando la seguente convenzione: molto comune ($\geq 1/10$); comune (da $\geq 1/100$ a $= 1/1.000$ a $= 1/10.000$ a **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO**Nelle donne in stato di gravidanza e durante l'allattamento il prodotto va utilizzato nei casi di effettiva necessita', sotto il diretto controllo del medico.