

## ZETALAX\*AD 18 supp 2,48 g

**Marchio:** ZETALAX  
**Codice Min.:** 028837019  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**DENOMINAZIONE** ZETALAX SUPPOSTE DI GLICERINA  
**CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA** Altri lassativi.  
**PRINCIPI ATTIVI** ZETALAX supposte per adulti. Ogni supposta contiene; principio attivo: glicerolo 2,250 g. ZETALAX supposte per bambini. Ogni supposta contiene; principio attivo: glicerolo 1,375 g. ZETALAX supposte per lattanti. Ogni supposta contiene; principio attivo: glicerolo 0,908 g.  
**ECCIPIENTI** Sodio stearato e sodio carbonato anidro.  
**INDICAZIONI** Trattamento di breve durata della stipsi occasionale e transitoria.  
**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI** Ipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al

paragrafo 6.1; dolore addominale acuto o di origine sconosciuta; nausea o vomito; ostruzione o stenosi intestinale; sanguinamento rettale di origine sconosciuta; crisi emorroidale acuta con dolore e sanguinamento; grave stato di disidratazione.  
**POSOLOGIA** La dose corretta e' quella minima sufficiente a produrre una facile evacuazione. E' consigliabile usare inizialmente le dosi minime previste. Posologia. Adulti: 1 supposta adulti al bisogno, per un massimo di 1 o 2 somministrazioni al giorno. Popolazione pediatrica. Adolescenti (12-18 anni): 1 supposta adulti al bisogno, per un massimo di 1 o 2 somministrazioni al giorno. Bambini di eta' compresa tra 2-11 anni: 1 supposta bambini al bisogno, per un massimo di 1 o 2 somministrazioni al giorno. Bambini di eta' compresa tra 1 mese e 2 anni: 1 supposta primainfanzia al bisogno, per un massimo di 1 o 2 somministrazioni al giorno. **NON SUPERARE LE DOSI CONSIGLIATE:** i lassativi devono essere usati il meno frequentemente possibile e per non piu' di sette giorni (vedere paragrafo 4.4). Una dieta ricca di liquidi favorisce l'effetto del medicinale.  
**CONSERVAZIONE** Conservare nella confezione originale.  
**AVVERTENZE** I lassativi devono essere usati il meno frequentemente possibile e per non piu' di sette giorni. L'uso per periodi di tempo maggiori richiede la prescrizione del medico dopo adeguata valutazione del singolo caso. Il trattamento della stipsi cronica o ricorrente richiede sempre l'intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione dei farmaci e la sorveglianza nel corso della terapia. E' inoltre opportuno che i soggetti anziani o in non buone condizioni di salute consultino il medico prima di usare il medicinale. L'abuso di lassativi puo' causare diarrea persistente con conseguente perdita di acqua, sali minerali (specialmente potassio) ed altri fattori nutritivi essenziali. Nei casi piu' gravi di abuso e' possibile l'insorgenza di disidratazione o ipopotassiemia, la quale puo' determinare disfunzioni cardiache o neuromuscolari, specialmente in caso di trattamento contemporaneo di glicosidi cardiaci, diuretici o corticosteroidi. L'abuso di lassativi, specialmente quelli di contatto (lassativi stimolanti), puo' causare dipendenza (e, quindi, possibile necessita' di aumentare progressivamente il dosaggio), stipsi cronica e perdita delle normali funzioni

intestinali (atonia intestinale). Negli episodi di stipsi, si consiglia innanzitutto di correggere le abitudini alimentari integrando la dieta quotidiana con un adeguato apporto di fibre ed acqua. Quando si utilizzano lassativi è opportuno bere al giorno almeno 6-8 bicchieri di acqua, o altri liquidi, in modo da favorire l'ammorbidimento delle feci. Precauzioni per l'uso: qualora le supposte apparissero rammollite, immergere i contenitori, prima di aprirli, in acqua fredda.

**INTERAZIONI** Non sono state riportate interazioni con altri medicinali o di altro genere.

**EFFETTI INDESIDERATI** Effetti indesiderati osservati durante il trattamento negli studi clinici e integrati con quelli raccolti durante l'esperienza post-marketing sono elencati nella tabella sotto riportata secondo la Classificazione per Sistemi ed Organi (utilizzando la terminologia MedDRA) e secondo la seguente frequenza: molto comune  $\geq 1/10$ ; comune  $\geq 1/100$ ,  $= 1/1.000$ ,  $= 1/10.000$ .

**GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Non sono stati effettuati studi adeguati e ben controllati sull'uso del medicinale in gravidanza o nell'allattamento. Anche se non ci sono evidenti controindicazioni dell'uso del medicinale in gravidanza e durante l'allattamento, si raccomanda di assumere il medicinale solo in caso di necessità e sotto controllo medico.