

ZINCO OSSIDO (ZETA FARMACEUTICI)*ung derm 30 g

Marchio: ZETA FARMACEUTICI
Codice Min.: 031362015
Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONEZINCO OSSIDO ZETA 10% UNGUENTO **CATEGORIA**
FARMACOTERAPEUTICAEmolliente e protettivo.
PRINCIPI ATTIVI100 g di unguento contengono:
zinco ossido 10,0 g.
ECCIPIENTIVaselina bianca, paraffina liquida.
INDICAZIONITrattamento lenitivo e
p r o t e t t i v o d i e c z e m i , d e r m a t o s i e l i e v i
escoriazioni.
CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARIipersensibilita' al principio attivo o ad uno
qualsiasi degli eccipienti.
POSOLOGIAApplicare l'unguento localmente, 1 o 2 volte al giorno, sulla cute
opportunamente lavata e asciugata. Per la sua azione astringente e decongestionante puo' essere
utilizzato anche su cute irritata (ad esempio dermatite da pannolino). Applicare uno strato di unguento in
modo da ricoprire l'area interessata (soprattutto quando viene utilizzato per il trattamento di dermatite da
pannolino); in caso di scottature e lesioni cutanee non infette, e' preferibile applicare un sottile strato
di unguento, utilizzando un bendaggio se necessario. Eseguire sulla zona interessata un leggero
massaggio circolare, in modo da ottenere un parziale assorbimento dell'unguento, a seguito del quale
rimane un residuo bianco opaco.
CONSERVAZIONEConservare nel contenitore originale al riparo dalla
luce.
AVVERTENZEIl medicinale deve essere impiegato solo per uso esterno; puo' essere nocivo se
ingerito. Evitare il contatto del farmaco con gli occhi; in caso di contatto accidentale, lavare
abbondantemente con acqua. Non impiegare il medicinale in caso di scottature o ferite potenzialmente
infette. Se l'unguento viene utilizzato per la dermatite da pannolino, controllare che l'eruzione cutanea
migliori entro pochi giorni; in caso contrario, e' necessario ricorrere a un trattamento diverso. L'uso,
specialmente se prolungato, di medicinali per uso locale puo' dare origine a fenomeni di irritazione o di
sensibilizzazione. In tale caso, e' necessario interrompere il trattamento e istituire un'adeguata
terapia.
INTERAZIONINessuna nota.
EFFETTI INDESIDERATIDi seguito sono riportati gli effetti
indesiderati dello zinco ossido organizzati secondo la classificazione sistemica organica MedDRA.
Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli effetti elencati.
Disturbi del sistema immunitario. Reazione allergica/di ipersensibilita': rash, orticaria, prurito e/o gonfiore (soprattutto
del viso, lingua, gola, labbra), senso di oppressione al petto, difficolta' a respirare. **Patologie della cute e
del tessuto sottocutaneo.** Irritazione della pelle: bruciore, formicolio e macchie scure della
pelle.
GRAVIDANZA E ALLATTAMENTOGeneralmente, l'uso dell'unguento in gravidanza e allattamento
e' considerato sicuro se applicato in zone circoscritte e per brevi periodi di tempo. **Gravidanza:** per lo
zinco ossido unguento non sono disponibili dati clinici relativi a gravidanze esposte. Tale medicinale, se
utilizzato in accordo con le modalita' d'uso, non viene assorbito e quindi non determina effetti sistemici; in
caso di cute lesa, puo' essere assorbito in minime quantita'. **Allattamento:** non sono disponibili dati
sull'utilizzo del medicinale durante l'allattamento e non e' noto se tale principio attivo passi nel latte
materno. Tuttavia, poiche' l'assorbimento del farmaco puo' ritenersi trascurabile, e' molto improbabile
che quantita' rilevanti raggiungano il latte materno.