

ZOLFO E POTASSIO CARBONATO (NEW FA.DEM.)*ung derm 30 g 17%+ 8%

Marchio: NEW.FA.DEM. SRL
Codice Min.: 031103017
Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONEZOLFO E POTASSIO CARBONATO NEW.FA.DEM. 17% + 8%
UNGUENTOCATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA Preparati contenenti zolfo, vari.
PRINCIPI ATTIVI100 g di unguento contengono: zolfo per uso esterno 17 g, potassio carbonato 8 g.
ECCIPIENTIVaselina bianca.
INDICAZIONITrattamento di infezioni micotiche cutanee, psoriasi, dermatiti seborroiche e di affezioni cutanee di natura parassitaria (scabbia).
CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARIipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti; estese lesioni cutanee; bambini di eta' inferiore a 3 anni.
POSOLOGIAAdulti e adolescenti, bambini di eta' superiore a 3 anni Applicare l'unguento, nella quantita' necessaria in relazione alla parte da trattare, 2 - 3 volte al giorno. Per il trattamento della scabbia, dopo l'applicazione dell'unguento e' necessario frizionare energicamente la zonada trattare; inoltre, l'unguento deve essere lasciato a contatto conla pelle per almeno 24 ore senza lavarsi. Il trattamento deve proseguire per almeno 3 giorni consecutivi.
CONSERVAZIONENon conservare ad una temperatura superiore ai 30 gradi C. Conservareil contenitore ben chiuso nella confezione originale.
AVVERTENZEUso esterno. Evitare il contatto con bocca, occhi, genitali e altre mucose. L'uso, specie se prolungato, dei medicinali per uso locale puo'dare origine a fenomeni di irritazione o di sensibilizzazione. In tale caso, e' necessario interrompere il trattamento e istituire una idonea terapia.
INTERAZIONINon sono stati condotti studi specifici di interazione.
EFFETTI INDESIDERATINon sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli effetti elencati. Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo: irritazione della cute e delle mucose, desquamazione, dermatiti, bruciore, prurito, eritema.
GRAVIDANZA E ALLATTAMENTOIn mancanza di studi specifici, il medicinale deve essere utilizzato durante la gravidanza e l'allattamento solo in caso di necessita' e sotto il diretto controllo medico.